

مقاله کوتاه علمی

اولین گزارش خسارت کنه پهن زرد (*Polyphagotarsonemus latus* (Acari: Tarsonemidae) از باغ‌های چای استان گیلان

سمر رمزی^۱، جلیل حاجی زاده^{۲*} و الهه دقیقی^۳

۱- پژوهشکده چای، موسسه علوم باگبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران، ۲- گروه گیاه‌پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران، ۳- دانش آموخته دکترا، دانشگاه برمن، آلمان

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۵/۱

چکیده

در پژوهشی با عنوان شناسایی بندپایان مرتبط با چای در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نمونه‌هایی از برگ و سرشاخه‌های آلوده به کنه‌های پهن (Broad mite) خانواده تارسونمیده (Tarsonemidae) جمع‌آوری شد. کنه‌های موجود از اندام‌های آلوده جداسازی شدند و پس از شفاف نمودن در محلول نسبیت در محیط هویر از آن‌ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. کنه‌ها با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. برای اولین بار از بین کنه‌های جمع‌آوری شده گونه (*Polyphagotarsonemus latus* Banks, 1904) روى چای از استان گیلان شناسایی شد. علائم خسارت این کنه به صورت بدشکلی، پیچیدگی، تیره و ضخیم شدن برگ و بدشکلی سرشاخه‌ها و جوانه‌ها، نمایان می‌شود. خسارت این آفت روی سرشاخه‌ها و جوانه‌های چای بسیار شدید است. این اولین گزارش از وجود کنه پهن زرد (*P. latus*) روی چای در باغ‌های چای شمال ایران می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: کنه تارسونمیده، پیش استیگما، ایران، گزارش جدید

(Arbab, 2002) این کنه را از مزارع سبب زمینی منطقه جیرفت در ایران گزارش نمود- (Khanjani and Irani- Nejad, 2006)

طی نمونه برداری های انجام شده در سال های ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ از باغ های چای در استان گیلان [روستای سراش لاهیجان (۴۹°۰۵'۱۸.۸۳"N, ۵۰°۰۵'۲۷.۴۳"E) تاریخ- های ۱۰، ۱۲، ۱۳؛ روستای سرچشم لاهیجان، ۹۷/۶/۱۳؛ روستای آهن دان لاهیجان ۹۸/۵/۶ (۳۷°۰۵'۳۰.۱۵"N ۴۹°۵۹'۰۵.۱۹"E) تاریخ لاهیجان (۳۷°۱۲'۲۵.۴۶"E ۵۰°۰۰'۱۲.۱۲"N) تاریخ- های ۱، ۹/۷/۳ و ۹/۵/۱۲؛ رحیم آباد رودسر ۹۷/۷/۱۵] نمونه های سرشاخه و برگ آلوده به کنه پهنه زرد جمع آوری شد. در آزمایشگاه اندام های آلوده به کنه در زیر استریو میکروسکوپ بررسی و کنه ها با قلم مو برداشته شدند. کنه ها در محلول نسبیت شفاف و در محیط هویر از آن ها اسلامید میکروسکوپی تهیه شد. شناسایی گونه کنه با استفاده Lin and Zhang, (2002). این کنه بیشتر از برگ های جوان و کل سطح زیرین برگ چای تغذیه می کند (شکل ۴). در نتیجه تغذیه کنه برگ ها سخت، زمحxt و قهوه ای رنگ می شوند، پس از تغییر رنگ لبه های برگ به سمت زیرین آن پیچیده می شود. پیچ خوردگی و چروکیدگی برگ از علائم نهایی خسارت هستند (شکل ۶). خسارت این کنه در سرشاخه ها و جوانه های چای بسیار شدید است به طوری که با تغذیه از شیره گیاهی باعث پیچ خوردگی و بدشکلی جوانه ها می شود (شکل ۵). طی بررسی های انجام شده مشخص شده است که این آفت می تواند در مدت زمان کوتاهی خسارت شدیدی به بوته های چای وارد کند. خسارت این گونه ممکن است تا چند هفته پس از حذف کنه ها باقی بماند اما حمله های شدید باعث بازدارندگی رشد و مرگ گیاه می شود. راه رفت، باد، خسارات (مسافر) و انسان از راه های انتشار این کنه می باشند. (Hamasaki et al., 2008; Saboori et al. 2010; Hajizadeh and Mortazavi, 2016)

کنه های تارسونمید متعلق به راسته پیش استیگمایان و خانواده Tarsonemidae هستند. این خانواده دارای ۵۳۰ گونه، ۴۰ جنس و ۳ زیر خانواده Acaripinae و Pseudotarsonemoidinae و Tarsoneminae پراکنده گی جهانی است (Saboori et al., 2010). تنوع تغذیه ای در این گروه از کنه ها مشاهده می شود، بسیاری از آن ها جلبک خوار، قارچ خوار و گیاه خوارند، برخی شکار گر سایر کنه ها و تعدادی انگل یا همزیست حشرات هستند. برخی گونه های شکار گر موجود در گرد و غبارخانه ها ممکن است باعث ایجاد حساسیت در انسان شوند (Hajizadeh and Mortazavi, 2016). بدن این کنه ها کوچک و طول آنها بین ۰/۱ تا ۰/۳ میلی متر است. ماده بالغ بیضوی پهنه با سطح پشتی محدب و به رنگ زرد روشن یا زرد متمایل به سبز با یک نوار سفید در وسط بدن است. کنه نر به رنگ ماده ولی فاقد نوار سفید در وسط بدن است، اندازه بدن آن کوچک تر و نصف اندازه ماده است. قطعات دهانی در این کنه ها شامل پالپ های قوی و کلیسرهای میله ای شکل می باشند. تخم آنها بیضوی، پهنه و مات بوده که چندین ردیف برآمدگی های سفید گرد روی آن قابل مشاهده است. لارو آنها دارای شش پا است که در هنگام خروج از تخم به رنگ سفید و سپس مات می شود. بیشتر گونه های کنه تارسونمید به روش بکرزاوی تولید مثل می کنند، لذا توانایی افزایش سریع جمعیت آن ها وجود دارد (Hajizadeh and Mortazavi, 2016). گونه Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) فارسی کنه پهنه، کنه نقره ای مرکبات و کنه زرد شناخته می شود. این کنه در نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری روی گیاهان زراعی، زینتی و وحشی و در مناطق معتدل در گلخانه ها یافت می شود. این کنه به دلیل خسارتی که روی گیاهانی مانند چای، پنبه، کائوچو، مرکبات، تباکو، سیب زمینی، لوبيا، فلفل، ژربرا، کوبک، گل آهاری و داودی ایجاد می کند حائز اهمیت می باشد (Hajizadeh and Mortazavi, 2016). کنه پهنه زرد برای اولین بار توسط بانک در سال ۱۹۰۴ (Banks, 1904) از غنچه انتهایی گیاه مانگو از واشنگتن جمع آوری و توصیف شد. اربابی

ترکیبی از روش‌های مبارزه شامل زراعی، رهاسازی شکارگرها (اغلب کنه‌های شکارگر Phytoseiidae) و استفاده از سموم کم خطر و اینم با دوره کارنس کوتاه در حالت طغیان آفت توصیه می‌شود. در ذیل به تعدادی از روش‌های تلفیقی موثر در کنترل کنه‌های تارسونمید اشاره می‌شود (Hajizadeh and Mortazavi, 2016):

- ۱- در اروپا استفاده از کنترل بیولوژیک (به کارگیری کنه‌های فیتوزئید و پاتوژن قارچی) بسیار موفق بوده است.
- ۲- حذف بقایای گیاهی و علف‌های هرز میزان کنه و سایر آفات (مانند سفید بالک‌ها) در باغ‌های چای ضروری است.
- ۳- ماشین آلات و ادوات کشاورزی به دلیل تاثیر در جابه‌جایی کنه در باغ باید به طور مرتب تمیز شوند.
- ۴- میزان کوددهی باید به اندازه مناسب و مورد توصیه باشد. افزایش میزان مصرف کود (به خصوص کودهای ازته) به واسطه شاداب و مناسب نمودن گیاه باعث افزایش جمعیت کنه‌ها می‌شود.
- ۵- استفاده از ارقام متحمل می‌باشد که در صورت وجود در کاهش خسارت آفت موثر است.
- ۶- در صورت طغیان و بروز خسارت این کنه در باغ‌های چای می‌توان از سموم و ترکیبات با منشاء گیاهی استفاده نمود. در برخی موارد استفاده از گوگرد و روغن برای کنترل کنه‌های تارسونمیده توصیه شده است.

References


- Arbabi, M., Namvar, P., Karami, S and Farokhi Far, M.** 2002. First report of damage of *Polyphagotarsonemus latus* on potato in Iran. **Journal of Entomology and Phytopathology** 69, 183-184.
- Banks, N.** 1904. Four new species of injurious mites. **Journal of the New York Entomological Society** 12, 53-56.
- Hajizadeh, J. and Mortazavi, Sh.** 2016. Agricultural Acarology: introduction to integrated mite management (translation). Guilan University press, 753 pp.
- Hamasaki, R. T., Shimabuku, R. and Nakamoto, S. T.** 2008. Guide to insect and mite pests of tea (*Camellia sinensis*) in Hawaii. University of Hawaii at Manoa. Cooperative Extension Service, Hawaii (Insect Pests. IP-28) 15 pp.
- Khanjani, M. and Irani-Nejad, K.H.** 2006. Injurious Mites of agricultural crops in Iran. Bu-Ali Sina University press, 515pp.
- Lin, J. and Zhang, Z. Q.** 2002. Tarsonemidae of the world (Acari: Prostigmata): key to Genera, Geographical distribution, systematic catalogue and annotated bibliography. Systematic and Applied Acarology Society, 440 pp.
- Saboori, A., Faraji, F. and Zahedi Golpayegani, A.** 2010. Mites of Greenhouses: Identification, Biology and Control (translation). Tehran University press, 289pp.

شكل شناسی

تخم‌ها بیضی شکل و شفاف، لاروها سفید و شفاف دارای شش پا هستند (شکل ۱). کنه ماده سفید رنگ یا زرد شفاف، بیضوی، طول بدن ۲۰۰ میکرون، پای چهارم در ماده سه بندی و باریک و به یک موی بلند مشخص ختم می‌شود (شکل ۲). کنه نر دارای بدنی کوتاه‌تر به طول ۱۶۸ میکرون می‌باشد. در این کنه دو شکلی جنسی دیده می‌شود بدین ترتیب که نرها با خصوصیات اندازه کوچکتر، بدن باریک در بخش عقبی، پاهای بلندتر، پای چهارم بزرگ و کلفت با یک ناخن از ماده قابل شناسایی هستند (شکل ۳). گناتونوزوما کپسولی شکل به طول ۳۲ میکرون، انگشت متحرک کلیسیر به شکل یک استایلت ظریف درآمده که در کنار پالپ‌های کوتاه قرار می‌گیرد. سطح پشتی پروپودوزوما در ماده دارای یک جفت تریکوبوتری چمامی و دو جفت موی ساده و در نر ۳ یا ۴ جفت موی ساده است.(Khanjani and Irani-Nejad, 2006; Saboori et al., 2010)

روش‌های کنترل

اولین و مهمترین روش برای کنترل این کنه، پایش جمعیت آن در باغ‌های چای است. بررسی هفتگی برگ‌های جوان و جوانه‌ها از ابتدای فصل بهار در زیر یک ذره‌بین دستی ضرورت دارد. به محض مشاهده ۳ تا ۵ کنه روی یک برگ جوان اقدامات کنترلی باید اعمال شود. در اغلب موارد برای کنترل کنه‌های خانواده تارسونمیده استفاده از



شکل‌های ۱-۴. مراحل رشد کنه *Polyphagotarsonemus latus*: (۱) لارو، (۲) ماده، (۳) نر، (۴) مراحل مختلف رشد کنه روی برگ، خط مقیاس برابر ۱۰۰ میکرون

Figures 1-4. Developmental stages of *Polyphagotarsonemus latus*: (1) larvae; (2) female, (3) male, (4) different developmental stages of mites of leaf, scale bar: 100 μ m



شکل‌های ۵-۶. علائم خسارت کنه *Polyphagotarsonemus latus* روی چای: (۵) سرشاخه و جوانه‌های خسارت دیده (۶) برگ‌های خسارت دیده

Figures 5-6. Damage symptoms of *Polyphagotarsonemus latus* on tea: (5) damaged branches and buds, (6) damaged leaves

Short paper

First report of damage caused by yellow broad mite *Polyphagotarsonemus latus* (Acari: Tarsonemidae) from tea gardens in Guilan province

S. Ramzi¹, J. Hajizadeh^{2*} and E. Daghighi³

1. Tea Research center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension organization (AREEO), Lahijan, Iran, 2. Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan, Rasht, Iran, 3. Doctoral graduate of University of Bremen, Germany

(Received: July 1, 2019- Accepted: September 14, 2019)

Abstract

During 2018- 2019 in a research entitled the identification of arthropods associated with tea, some samples of leaves and branches of tea plant infected by broad mite (Tarsonemidae) were collected. Mites were separated from infected plant parts, cleared in Nesbit's fluid and mounted on microscopic slides in Hoyer's medium. Mites were identified by using valid references. Among collected mites, *Polyphagotarsonemus latus* (Banks, 1904) was identified for the first time from Guilan province on tea plant. The symptoms of damage are diagnosed by deformity, curling, darkening and thickness of leaves and deformation of tip branches and buds. The damage of broad mite is so severe on tip branches and buds of tea plant. This is the first report of yellow broad mite (*Polyphagotarsonemus latus*) on tea plant in Northern Iran tea gardens.

Key words: Tarsonemid mites, Prostigmata, Iran, new record

*Corresponding author: hajizadeh@guilan.ac.ir