

مقاله کوتاه علمی

اولین گزارش از خسارت یک حشره آفت روی گیاه زراعی تاج خروس در ایران

مهدى اسفنديارى^{۱*} و امير آينه‌بند^۲

۱، استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ۲، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات،
دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

(تاریخ دریافت: ۹۰/۱۱/۱۰ تاریخ پذیرش: ۹۱/۱/۲۰)

چکیده

گیاه زراعی *Amaranthus cruentus* L. تاج خروسی از خانواده Amaranthaceae است که می‌تواند به عنوان علوفه دام مورد استفاده قرار گیرد. این گیاه به تازگی به طور وسیع در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته است. در تابستان ۱۳۹۰ طی مطالعه ای روی ویژگی های زراعی این گیاه در اهواز، خسارت یک سرخرطومی روی آن به طور وسیع مشاهده شد. پس از بررسی ها این گونه *Hypolixus pica* Fabricius, 1798 تشخیص داده شد. این اولین گزارش از خسارت یک حشره آفت روی این گیاه زراعی در ایران است. برخی علائم خسارت این آفت در این گزارش شرح داده شده است.

واژه های کلیدی: *Amaranthus cruentus* ،Curculionidae ، *Hypolixus pica* ، سرخرطومی

متراوف^۱ گونه Hypolixus pica Fabricius, 1798 در نظر گرفته شده است. در واقع این آفت همان سرخرطومی *H. pica* می‌باشد که در دزفول به عنوان کنترل کننده بالقوه علف هرز تاج خروس وحشی بررسی شده است. مشاهدات و بررسی های انجام شده روی گیاهان آلوده نشان داد که این سرخرطومی تخم‌های خود را روی شاخه ها و دمبرگ‌ها گذارده و با ماده‌ای سیاهرنگ روی آن ها را می-پوشاند. این محل کمی برآمده شده و بیشتر در دمبرگ‌های گیاه قرار دارد. حشره بالغ نیز مقداری از برگ‌ها تغذیه می‌کند. با بررسی گیاهان آلوده مشخص شد که لاروها پس از تفریخ شروع به تغذیه نموده و دالانی را درون ساقه گیاه تشکیل می‌دهند. جهت تغذیه لارو و تشکیل دالان از بالا به سمت پایین بود، به طوری که به طرف پایین، دالان بزرگ شده و در نهایت به محفظه‌ای ختم می‌شد که پر از فضولات لاروی بود. شفیره در این محفظه تشکیل شده و ساقه در این محل کمی برآمده بود. گاهی کانال‌های موازی که توسط چند لارو تشکیل شده در ساقه های قطورتر دیده شد. با اینحال تغذیه از ریشه و طوقه مشاهده نشد. حشره کامل پس از خروج از شفیره‌گی از گیاه خارج شده و حفره‌ای در محل خروج خود روی گیاه بر جای می‌گذارد. جمعیت زیادی از شفیره و حشره بالغ در شهریور ماه ۱۳۹۰ مشاهد شد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که این حشره پس از تخم ریزی در بهار و سپس رشد لاروها در انتهای تابستان یک نسل خود را تکمیل می‌کند.

Pourtaherzari et al. (2010) اظهار می‌دارند که سرخرطومی *H. pica* به عنوان عامل بالقوه‌ای برای پرورش انبوه و رهاسازی جهت کنترل علف هرز تاج خروس در باغ های مرکبات خوزستان می‌تواند مدل نظر باشد. اما با توجه به این که کشت وسیع گیاه علوفه‌ای آمارانت در این استان در دست بررسی است به نظر می‌رسد، یافتن راهکاری جهت جلوگیری از خسارت این سرخرطومی روی گیاه علوفه‌ای آمارانت باید در اولویت باشد و در مورد استفاده از این سرخرطومی به عنوان عامل کنترل بیولوژیک مطالعات بیشتری صورت گیرد.

مقدمه
گیاه زراعی Amaranthus cruentus یک تاج خروس (آمارانت) متعلق به خانواده Amaranthaceae می‌باشد که می‌تواند به عنوان علوفه دام مورد استفاده قرار گیرد. این گیاه به تازگی به علت داشتن پتانسیل مطلوب جهت کشت و توسعه در خوزستان، به طور وسیع در این استان مورد مطالعه قرار گرفته است (Aynehband, 2004; Aynehband et al., 2007).

خسارت و تغذیه برخی سرخرطومی‌ها از جمله گونه هایی از جنس Hypolixus روی گیاهان وحشی و واریته های زراعی آمارانت در سایر نقاط دنیا گزارش شده است (Louw et al., 1995) (F.) متعلق به قبیله Lixini، زیرخانواده Lixinae و خانواده Curculionidae می‌باشد. لارو و شفیره این حشره کرم رنگ هستند. حشره بالغ قهوه ای رنگ بوده و موهایی کرم رنگ لکه های روشن روی آن ایجاد نموده است. طول بدن Pourtaherzari et al. (2009, 2010) از بالا حدود ۱۰ میلی‌متر می‌باشد. برای اولین بار تغییرات جمعیت این سرخرطومی را روی علف هرز تاج خروس وحشی ریشه قرمز L. در باغ های مرکبات دزفول بررسی کردند. آن ها گزارش کردند که حشره کامل دزفول بررسی کردند. آن ها گزارش کردند که حشره کامل و لارو این سرخرطومی با تغذیه از تاج خروس وحشی مذکور رشد و تولید مثل آن را مختل نموده و جمعیت آن را کاهش می‌دهد. ایشان با بررسی زیست شناسی سرخرطومی مذکور روی تاج خروس وحشی ریشه قرمز (A. retroflexus) آن را دارای پتانسیل کافی برای کنترل بیولوژیک این علف هرز در باغ های مرکبات دزفول دانستند.

در تابستان ۱۳۹۰ طی مطالعه ای روی ویژگی های زراعی گیاه آمارانت در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز خسارت یک حشره روی گیاهان آمارانت کشت شده به طور وسیع مشاهده شد. پس از بررسی های تاکسونومیک و شناسایی اولیه حشره برای تایید به آقای دکتر Fabio Talamelli Centro Studi در ایتالیا (Naturalistici Valconca) ارسال شد. به عقیده ایشان این سرخرطومی گونه Hypolixus nubilosus Boheman, 1836 است که به تازگی توسط Gültekin (2006)

سپاسگزاری

از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر
حمایت مالی از این تحقیق سپاسگزاری می‌شود.

منابع

- Aynehband, A.** 2004. Introducing the Amaranth as a new fodder crop for the first time in Iran. **Scientific Journal of Agriculture** 27 (2): 163-171.
- Aynehband, A., Aqasizadeh, V. and Meskarbashi, M.** 2007. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of Amaranth cultivars in different planting dates. **Iranian Journal of Field Crops Research** 5 (2): 221-228.
- Gültekin, L.** 2006. On some *Lixinae* types of J. C. Fabricius (Coleoptera, Curculionidae). **Fragmenta Entomologica**, 38(1): 111-133.
- Louw, S., Van Eeden, C. F. and Weekds, W. J.** 1995. Curculionidae (Coleoptera) associated with wild and cultivated *Amaranthus* spp. (Amaranthaceae) in South Africa. **African Crop Science Journal** 3 (1): 93-98.
- Pourtaherzari, R., Shishehbor, P. and Eslamizadeh, R.** 2009. Population dynamics of weevil *Hypolixus pica*, the natural enemy of wild amaranth, *Amaranthus retroflexus* L., in citrus orchards and identification of its parasitoids in Dezful. **Plant Protection Journal** 1(4): 369-378.
- Pourtaherzari, R., Shishehbor, P. and Eslamizadeh, R.** 2010. A Study of The biology of Amaranth stem-boring weevil, *Hypolixus pica* (Fabricius) on red root pigweed, *Amaranthus retroflexus* L. in Dezful. **Iranian Journal of Plant Protection Science** 41(2): 225-232.

First report on damages caused by an insect pest on Amaranth crop in Iran

M. Esfandiari¹, A. Aynehband²

1, Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, 2, Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz

(Received: January 30, 2012 – Accepted: April 8, 2012)

Abstract

Amaranth crop, *Amaranthus cruentus* L. (Amaranthaceae), can be used as forage crop. Recently, this crop has been studied in detail in Khuzestan province. During a study on agronomy characteristics of this crop in Ahvaz in summer 2011, widespread damage of a curculionid beetle was observed on the cultivated crop. The beetle was identified as *Hypolixus pica* Fabricius, 1798. This is the first report of an insect pest on the mentioned Amaranth crop in Iran. Here we report some damage symptoms of this curculionid pest on *Amaranthus cruentus*.

Keywords: *Amaranthus cruentus*, Weevil, *Hypolixus pica*, Curculionidae

*Corresponding author: sfandiari77@yahoo.com