

تأثیر قارچ *Lecanicillium longisporum* (Hypocreales: Clavicipitaceae) روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید *Encarsia formosa* (Hymenoptera: Aphelinidae)

محمود فاضلی دینان^{*}، رضا طلایی حسنلویی^۱، حسین اللہیاری^۲، عزیز خرازی پاکدل^۳، سید حسین گلدان‌نماز^۴

۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ به ترتیب دانشجوی دکتری، دانشیار، دانشیار گروه گیاه‌پژوهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

(تاریخ دریافت: ۹۱/۵/۱) (تاریخ پذیرش: ۹۱/۶/۳۱)

چکیده

تأثیر قارچ *Lecanicillium longisporum* روی توان تولیدمثلی زنبور پارازیتوئید *Encarsia formosa* در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آلدگی قارچی با پاشش غلظت $10^5 \times 9/5$ کنیدی در میلی‌لیتر روی پوره سن سوم سفیدبالک گلخانه ایجاد شد و در چهار بازه زمانی صفر، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از پاشش در اختیار زنبور پارازیتوئید قرار گرفت. طول عمر، دوره پیش از تخم‌گذاری، طول مدت تخم‌گذاری و سایر پارامترهای مهم جدول زندگی در تیمارهای مختلف پس از اسپورپاشی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور پارازیتوئید روی میزانهای سالم $20/0$ برابر روز بوده و در بازه‌های زمانی پس از پاشش قارچ روی میزان، یک روند کاهشی روی نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور ایجاد شد. نرخ خالص تولید مثل (R_0)، نرخ ناخالص تولید مثل (GRR)، زمان لازم برای رشد یک نسل (T) و نرخ متناهی رشد (λ) پارازیتوئید روی میزان سالم به ترتیب $41/75$ نتاج ماده، $43/42$ نتاج ماده، $18/32$ روز و $1/22$ روز برآورد شد که اختلاف معنی‌داری را با بازه‌های زمانی پس از آلدگی قارچی میزان نشان داد و بیانگر این نکته بود که توان تولیدمثلی زنبور پارازیتوئید روی میزانهای آلدده به قارچ در مقایسه با میزانهای سالم کاهش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: پارامتر جدول زندگی، بازه زمانی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، *Lecanicillium Encarsia formosa*

می باشد. به خاطر این توانایی، علاوه‌مندی برای استفاده از این قارچ در برنامه‌های مدیریتی تلفیقی آفات و بهویژه در سامانه‌های گلخانه‌ای و سایر محصولات زیر پوشش افزایش یافته است. برای استفاده هم‌زمان از دو عامل کنترل بیولوژیک زنبور *E. formosa* و قارچ بیمارگر *L. longisporum* در کنترل سفیدبالک گلخانه و در قالب برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات، بررسی اثر قارچ بر ویژگی‌های زیستی زنبور پاراپتوئید ضروری به نظر می‌رسد که این کار از طریق مقایسه پارامترهای جدول زندگی امکان‌پذیر می‌باشد. مناسب‌ترین پارامتر برای انجام مقایسه، برآورد نرخ ذاتی افزایش جمعیت یا r_m است. مقدار r_m هر موجود بستگی به زادآوری، طول عمر و سرعت رشد آن دارد که در شرایط استاندارد شده‌ای تعیین می‌شود و همین امر امکان مقایسه حشرات را در تیمارهای مختلف فراهم می‌آورد (Farhadi et al., 2011).

لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین پارامترهای جدول زندگی زنبور پاراپتوئید *E. formosa* روی پوره‌های سن سوم سفیدبالک سالم و آلوده به قارچ و مقایسه آن‌ها با یکدیگر در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

تهیه کلنی سفیدبالک و زنبور پاراپتوئید

سفیدبالک گلخانه، *T. vaporariorum* و زنبور *E. formosa* از منطقه هشتگرد استان البرز جمع‌آوری و برای تشکیل کلنی به آزمایشگاه منتقل شد. سفیدبالک گلخانه روی گیاه خیار به عنوان میزبان آفت مستقر شد و پس از استقرار کلنی آفت، پوره‌های سن سوم سفیدبالک در اختیار زنبور قرار گرفت. پوره‌های پاراپتوئید شده جمع‌آوری و حشرات ماده برای بررسی‌های بعدی نگهداری و با آب و عسل ۱۰ درصد تغذیه شدند. شرایط نگهداری کلنی دمای 25 ± 1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65 ± 5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بود.

تهیه دیسک‌های برگی

از آن جایی که سفیدبالک دارای رفتار تغذیه‌ای خاص می‌باشد، در بررسی‌های زیست‌سنگی روی مراحل نابالغ شیوه‌ای عمل شد که برگ‌های گیاهی حاوی مراحل نابالغ

مقدمه

سفیدبالک گلخانه با نام علمی *Trialeurodes vaporariorum* Westwood آفته با دامنه میزبانی بسیار وسیع می‌باشد و در کلیه کشورهای اروپایی و آسیایی مشاهده می‌شود. این آفت در ایران نیز در بیشتر مناطق پراکنده‌گی دارد (Behdad, 1987). این آفت در مزارع، کشت‌های زیر پوشش و گلخانه‌ها فعالیت داشته و روی گیاهان مختلف زراعی و زینتی از جمله توتون، لوبیا، سویا، گوجه‌فرنگی، بادمجان، خیار، فلفل، بنت قنسول، داودی و شمعدانی خسارت‌زا می‌باشد (Cuthbertson et al., 2008).

همچنین سفیدبالک گلخانه ناقل برخی از بیماری‌های ویروسی در سبزیجات و گیاهان زینتی به حساب می‌آید (Nombela et al., 2000).

Encarsia formosa Gahan (Hym.: Aphelinidae) دارای پراکنش جهانی بوده و کاربرد به نسبت فراوانی را در کنترل سفیدبالک‌ها بهویژه روی محصولات گلخانه‌ای دارا می‌باشد. مهم‌ترین محصولات گلخانه‌ای که توسط این زنبور تحت پوشش قرار داده شده‌اند، گوجه‌فرنگی و خیار بوده است (van Lenteren, 1995; van Lenteren and Woets, 1988).

آن برای تغذیه، پوره‌های سن دوم میزبان می‌باشد (Alpen et al., 1976).

این زنبور در تمام مراحل نابالغ سفیدبالک گلخانه به غیر از تخم و مرحله متحرک سن اول، تخم‌ریزی می‌کند اما ترجیح آن برای پاراپتوئید، پوره‌های سن سوم و شفیره سفیدبالک می‌باشد. وقتی زنبور پاراپتوئید سنین ترجیحی خود را انگلی می‌کند، نرخ خروج حشرات Boisclair et al., 1990; Nchols and Tauber, 1977; Nell et al., 1976) کامل بسیار زیاد می‌باشد از میان قارچ‌های بیمارگر حشرات، مشخص شده که برخی گونه‌های جنس قارچ *Lecanicillium* علاوه بر حشرات (Askary et al., 1998; Cuthbertson and Walters, 2005)، روی عوامل بیماری‌زای گیاهی (Askary et al., 1998; Miller et al., 2004) و نماتوودهای انگل گیاهان (Meyer et al., 1990) نیز موثر

بودند در اختیار آن‌ها قرار گرفت و بازدید روزانه تا زمان تشکیل شفیره ادامه یافت. برگ‌های حاوی پوره‌های سن سوم سفیدبالک به منظور شادابی روی آگار دو درصد درون تشکیک‌های پتری ۹ سانتی‌متری ثابت شده بود. مقدار کمی آب و عسل ۱۰ درصد نیز برای تغذیه زنبور داخل تشکیک‌های پتری قرار گرفت. تعویض پوره‌های سفیدبالک به صورت روزانه و تا زمان مرگ آخرین زنبور ادامه یافت. پوره‌های پارازیته شده به صورت روزانه از تشکیک پتری خارج و به لوله‌های آزمایش (12×75 میلی‌متر) منتقل و تا ظهور حشرات کامل نگهداری شدند. کلیه مراحل در شرایط کنترل شده دمایی 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65 ± 5 درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. با شمارش تعداد پوره‌های پارازیته شده و نتایج هر یک از تیمارهای آزمایشی به صورت روزانه ثبت شدند. در نهایت داده‌ها بر اساس اطلاعات مربوط به سن (x)، نسبت بقا (I_x) و باروری ویژه سن (m_x) (تعداد ماده‌های حاصل از تولید مثل یک زنبور ماده در سن x) در جداول مربوطه تنظیم شدند.

تجزیه آماری

اطلاعات مربوط به سن (x)، نسبت بقا (I_x) و باروری ویژه سن (m_x) هر ماده مطابق روش جدول زندگی دو جنسی (Chi and Liu, 1988) ۱۹۸۵؛ به دلیل این‌که رشد و نمو تخم و سنین لاروی زنبور *E. formosa* داخل بدن پوره‌های سفیدبالک انجام می‌شود و نیز جنس نر در این زنبور بسیار نادر است، طول زندگی پارازیتوئید به سه مرحله پیش از بلوغ (تخم + لارو)، شفیره و ماده بالغ تقسیم شد. پارامترهای جدول زندگی حشره (λ , R_0 , T و GRR) نیز با استفاده از نرم-افزار Tow-Sex-MSchart (Chi, 2008) محاسبه شد. همچنین برای محاسبه میانگین پارامترهای جدول زندگی و Tow-Sex-MSchart (Chi, 2008) استفاده شد. مقایسه میانگین پارامترها بین افراد سالم و آلدۀ در چهار بازه زمانی ذکر شده با استفاده از آزمون F- LSD در سطح پنج درصد و با استفاده از نرم‌افزار SYSTAT-12 انجام گرفت.

سفیدبالک برای مدتی (حداقل دو هفته) سبز و سالم نگه داشته شوند تا مورد تغذیه سفیدبالک قرار بگیرند. برای این منظور دیسک‌های برگی به قطر ۵ تا ۷ سانتی‌متر از برگ‌های خیار آلدۀ تهیه شد و روی تشکیک‌های پتری حاوی آب و آگار دو درصد قرار گرفت. در نهایت با بررسی برگ‌ها زیر استریومیکروسکوپ، رسیدن تعداد تخم‌ها و سایر مراحل نابالغ در هر دیسک برگی به تعداد دلخواه بررسی شد (Karimi, 1999).

کشت قارچ و تهیه زادهای قارچ

قارچ L. longisporum LRC216 جدا شده روی کرم سیب که در آزمون‌های اولیه (داده‌های منتشر شده) زهرآگینی زیادی علیه سفیدبالک گلخانه نشان داد، روی محیط PDA (potato dextrose agar) کشت داده شد. پس از ۱۴ روز و کامل شدن اسپورزایی، سوسپانسیونی با غلظت $9/5 \times 10^5$ کنیدی در میلی‌لیتر تهیه شد. این مقدار، برآورد LC₅₀ قارچ روی پوره‌های سن سوم سفیدبالک گلخانه در آزمون مقدماتی بود (داده‌های منتشر نشده).

تعیین پارامترهای جدول زندگی پارازیتوئید روی پوره‌های سن سوم سفیدبالک سالم و آلدۀ به قارچ برای برآورد پارامترهای جدول زندگی از پوره‌های سن سوم سفیدبالک سالم (تیمار شده با آب مقطر و Tween 80) به عنوان شاهد و پوره‌های آلدۀ به قارچ L. longisporum به عنوان تیمارهای آزمایش استفاده شد. پوره‌های سالم و پوره‌های سن سوم آلدۀ ۱۰۰ پوره برای هر تیمار آزمایشی) به قارچ در چهار بازه زمانی صفر، ۴۸، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از پاشش، به مدت ۲۴ ساعت در اختیار ۲۰ زنبور ماده E. formosa قرار گرفتند تا شفیره‌های هم‌سن زنبور به دست آید. پس از این مدت، زنبورها از ظرف خارج شدند و پوره‌ها تا زمان تشکیل شفیره زنبور که با سیاه رنگ شدن پوره سفیدبالک مشخص می‌شد مورد بازدید روزانه قرار گرفتند. برای هر تیمار آزمایشی ۴۰ شفیره زنبور انتخاب شد و ماده‌های حاصل از این شفیره‌ها به صورت انفرادی برای اثر قارچ بر آماره‌های جدول زندگی پارازیتوئید مورد استفاده قرار گرفتند. بدین ترتیب که به طور روزانه ۴۰ عدد پوره سن سوم سفیدبالک سالم که روی دیسک‌های برگی خیار مستقر شده

نتایج و بحث

زنبورهای آلوده شده به باکتری کمتر از زنبورهای سالم است. نتایج برخی از پژوهش‌ها نشان داده است که طول دوره رشد و نمو *E. formosa* می‌تواند در شرایط مختلف متفاوت باشد (Qiu et al., 2004) به طوری که قارچ بیمارگر نیز می‌تواند عاملی برای نشان دادن این روند تغییرات بهشمار آید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زنبور ماده در بازه‌های زمانی طولانی‌تر پس از پاشش قارچ (۷۲ ساعت پس از تیمار قارچ) به زمان بیشتری برای کامل کردن دوره پیش از بلوغ نیاز دارد. این احتمال وجود دارد هرچه که از زمان پاشش قارچ می‌گذرد رقابت بین زنبور و قارچ بهویژه برای لاروهای جوان، سبب می‌شود که لارو زنبور انژری بیشتری را صرف پدیده رقابت کرده و در نتیجه کل مرحله نابالغ نیز طولانی‌تر شود اما اگر از آلودگی پوره‌های میزان به قارچ مدت زیادی نگذشته باشد و هنوز قارچ بیمارگر توسعه و تکثیر کافی نیافته باشد لارو زنبور با سرعت بیشتری رشد خود را کامل کرده و فضا را برای قارچ محدودتر می‌کند. بنابراین هرچقدر که لارو زنبور پارازیتوئید در رویارویی با قارچ بیمارگر مسن تر باشد از شانس بالاتری برای رقابت با قارچ بر سر میزان مشابه برخوردار بوده و احتمال میزان خروج موقفيت-آمیز زنبور نیز بیشتر خواهد بود (Fransen and van Lenteren, 1994). در پژوهش حاضر مشخص شد که با طولانی‌تر شدن بازه‌های زمانی پاشش قارچ روى میزان زنبور پارازیتوئید، طول عمر حشرات کامل خارج شده از این میزان‌ها نیز کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند به دلیل رقابت بین لارو پارازیتوئید و قارچ بیمارگر بر سر منبع غذایی مشترک باشد. در حقیقت احتمال بروز رقابت بین قارچ و پارازیتوئید با افزایش بازه‌های زمانی افزایش می‌یابد و قارچ کیفیت میزان را برای لارو پارازیتوئید کاهش می‌دهد (Brobyn et al., 1988; Rashki et al., 2009).

چنانچه در شکل ۱ روند نرخ بقا و تولید مثل ویژه سنی زنبور پارازیتوئید در تیمارهای مختلف مشاهده می‌شود، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر حشره ماده در طول زندگی خود به طور متوسط ۴۱/۷۵ تخم داخل بدن پوره‌های میزان سالم می‌گذارد؛ به عبارت دیگر با توجه به انفرادی بودن پارازیتوئید، می‌توان گفت که هر پارازیتوئید به طور متوسط

نتایج به دست آمده از ثبت داده‌های تولیدمثلی زنبورها روی سفیدبالک‌های سالم و آلوده شده در بازه‌های زمانی متفاوت پس از پاشش قارچ در جدول ۱ آورده شده است. بررسی‌ها نشان داد که زنبور پارازیتوئید دوره نمو تخم و لاروهای آلوده در چهار بازه زمانی صفر، ۴۸، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از پاشش به ترتیب در ۱۰/۲، ۱۰/۸، ۱۰/۶ و ۱۱/۱ روز طی می‌کند ($F=9/49$, $P < 0.001$, $df=195$, ۴). دوره شفیرگی پارازیتوئید روی سفیدبالک سالم به طور متوسط ۴/۴ روز و روی چهار بازه زمانی به ترتیب در ۴/۸، ۵/۱، ۵/۲ و ۵/۳ روز محاسبه شد ($F=9/52$, $P < 0.001$, $df=195$, ۴). مقایسه زمان کل رشد و نمو مرحله پیش از بلوغ این پارازیتوئید (تخم + لارو، شفیره) روی سفیدبالک‌های سالم (شاهد) و آلوده شده به قارچ در تیمارهای زمانی متفاوت پس از پاشش بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در تیمارهای آزمایشی با شاهد بود به‌طوری که بیشترین زمان این مرحله مربوط به پارازیتوئیدهایی بود که دوره رشدی خود را در میزان‌هایی که ۷۲ ساعت از آلودگی آنها با قارچ می‌گذشت، تکمیل کردند ($F=19/13$, $P < 0.001$, $df=195$, ۴). طول عمر حشرات کامل *E. formosa* که از پوره‌های سالم سفیدبالک خارج شده بودند به طور متوسط ۸/۱ روز بود که این میزان در بازه‌های زمانی بعد از پاشش قارچ برای حشرات کامل زنبور به طور معنی‌دار کاهش یافت ($P < 0.001$, $df=15/52$, $F=195$). عسگری و عجم حسنی (Askari and Ajam-Hassani, 2008) در بررسی‌های خود نشان دادند که میانگین طول عمر افراد ماده زنبور پارازیتوئید *Aphidius nigripes* زمانی که تحت تاثیر قارچ بیمارگر *L. muscarium* (Petch) Zare et Gams قرار گرفتند به طور معنی‌داری نسبت به شاهد کاهش یافت اما برای میانگین کل دوره زندگی بین شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری مشاهد نکردند. همچنین سالاما و همکاران (Salama et al. 1991a, b) در بهم‌کنش بین باکتری *Bacillus thuringiensis* Berliner و زنبور *Bracon brevicornis* گزارش کردند که طول عمر

اثر نامطلوب داشته باشد این دو عامل بیولوژیک دوره زندگی خود را تکمیل کنند. نتایج پژوهش حاضر در مورد کاهش میزان پارازیتیسم با افزایش مدت زمان پس از پاشش قارچ نشان می دهد که احتمال بروز رقابت بین قارچ و پارازیتوبئید با افزایش بازه های زمانی افزایش می یابد. به نظر می رسد که قارچ کیفیت میزان را برای لارو پارازیتوبئید کاهش می دهد و گاهی حتی موجب مرگ میزان می شود (Brobyn *et al.*, 2009) گاهی حتی موجب ۱۹۵، df=۲۵/۲۱، P<۰.۰۰۱ (Rashki *et al.*, 2009) ۱۹۸۸؛ Rashki *et al.*, 2009) دشمن طبیعی منابعی که برای تولید تخم استفاده می کند را به سرمایه گذاری برای دفاع علیه بیمار گر اختصاص دهد (Roy *et al.*, 2008) به هر حال اطلاعات کمی در مورد توان تولید مثلی پارازیتوبئیدها زمانی که از میزان های آلوده به قارچ خارج می شوند، وجود دارد.

مقدار پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوبئید در جدول ۲ ارائه شده است. مقایسه آماری نشان داد که بین پارامترها اختلاف معنی دار وجود دارد به طوری که قارچ *L. longispororum* در بازه های زمانی متفاوت و در مقایسه با شاهد موجب کاهش نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r_m)، نرخ خالص تولیدمثل (R_0)، نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) شد درحالی که میانگین زمان نسل (T) در بازه های زمانی متفاوت را افزایش داد (جدول ۲). کاهش میزان r_m شاید به دلیل افزایش دوره رشد و نمو باشد. فاتیحا و همکاران (Fatiha *et al.*, 2008) گزارش کردند که کاربرد مستقیم قارچ بیمار گر *Verticillium lecanii* Nees روی دشمنان طبیعی سفیدبالک، میزان نرخ خالص تولیدمثل R_0 را کاهش می دهد درحالی که طول دوره یک نسل (T) بین تیمارهای سالم و آلوده به قارچ متفاوت نبود. از آن جا که منابع بسیار کمی در مورد اثرات بیمار گرهای حشرات روی پارامترهای جدول زندگی دشمنان طبیعی آفات در این زمینه ضروری به نظر می رسد (Lacey *et al.*, 1997). تعدادی از مطالعات نشان داده اند که در کاربرد همزمان قارچ بیمار گر و زنبور پارازیتوبئید، لارو زنبور توانایی رقابت با عامل بیمار گر را بر سر منبع غذایی ندارد (Scopes, 1970) زیرا ارزش غذایی میزان در آلودگی به عامل

در طول زندگی خود ۴۱/۷۵ عدد پوره را پارازیته می کند. با در نظر گرفتن بازه های زمانی پس از پاشش، مشاهده شد که در بازه های زمانی طولانی تر میزان تخم گذاری و در نتیجه میزان پارازیتوبئید پوره ها توسط زنبور به صورت معنی داری کاهش یافت (Rashki *et al.*, 2009) (جدول ۱). راشکی و همکاران (Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. با *Aphidius matricariae* Haliday روی میزان های شته آلوده به قارچ در بازه های زمانی متفاوت گزارش کردند که تعداد مو میابی های تولید شده توسط هر فرد ماده و درصد خروج افراد ماده در نسل بعد در بازه های زمانی متفاوت اختلاف معنی داری داشتند، اگرچه برخی پارامترهای جدول زندگی تحت تاثیر پاشش قارچ قرار نگرفتند. پاول و همکاران (Powell *et al.*, 1986) نیز نتایج مشابهی را در زمان تاثیر قارچ (*Pandora (Erynia neoaphidis* Humber *Aphidius rhopalosiphii* de Stefani-Perez) شته های میزان زنبور پارازیتوبئید گزارش کردند. مطالعات نشان می دهد که کاهش میزان مو میابی کردن میزان های آلوده به قارچ توسط زنبورهای پارازیتوبئید ۲۴ ساعت پس از آلودگی میزان فرصت مناسبی را برای قارچ بیمار گر در رقابت با لاروهای جوان فراهم می آورد در حالی که لاروهای پارازیتوبئیدهایی که مسن تر می باشند به احتمال بیشتر در رقابت با قارچ بیمار گر بر سر میزان موفق تر عمل خواهند کرد، بنابراین حساسیت کمتری به آلودگی قارچ از خود نشان می دهدن (Fransen and van Lenteren, 1994). در مطالعه ای دیگر گزارش شد که زنبورهای *E. formosa* زمانی که از میزان های سفیدبالک آلوده به قارچ لحاظ میزان تولیدمثل تفاوت معنی داری با زنبورهای خارج شده از میزان های سالم نداشتند (Fransen and Van Lenteren, 1993). باور استاک و همکاران (Baverstock et al., 2005) بیان کردند که این امکان وجود دارد که بین قارچ بیمار گر و زنبور پارازیتوبئید سازگاری وجود داشته باشد و بدون این که آلودگی قارچی روی میزان تخمریزی زنبور

زنبور پارازیتوبی اثر نامطلوبی می‌گذارد و باعث می‌شود در نهایت نرخ ذاتی افزایش جمعیت کاهش پیدا کند. بنابراین با در نظر گرفتن انتخاب زمان مناسب برای پاشش قارچ بیمارگر و رهاسازی زنبور پارازیتوبی باید احتمال بروز چنین رخدادی را در ترکیب این عوامل کنترل کننده بیولوژیک در برنامه‌های مدیریتی تلفیقی سفیدبالک گلخانه به حداقل رساند.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان این مقاله از مرکز تحقیقات Grant Duke، کاتالدا برای ارسال جدایه قارچ و آزمایشگاه Lethbridge کنترل بیولوژیک گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه تهران، بخاطر در اختیار گذاشتن امکانات برای انجام این تحقیق قدردانی می‌کنند.

بیمارگر تحت تاثیر قرار می‌گیرد که نقش مهمی در تعیین میزان افزایش جمعیت پارازیتوبی بازی می‌کند و می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده رشد جمعیت محسوب شود. عوامل کنترل بیولوژیک قارچی می‌تواند با تاثیر بر کیفیت میزان، باروری و میزان تخریزی دشمنان طبیعی، کیفیت و سودمندی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد (Wekesa et al., 2007). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که قارچ بیمارگر *L. longisporum* می‌تواند *E. formosa* را حدی اثر منفی روی رشد پارازیتوبی داخلی داشته باشد. بررسی پارامترهای جدول زیستی باروری زنبور پارازیتوبی *E. formosa* بر پوره‌های سفیدبالک آلدوده به قارچ در این پژوهش نشان داد که با افزایش زمان آلدودگی پوره‌ها به قارچ و تغذیه زنبور پارازیتوبی، وجود قارچ بر پارامترهای زیستی

جدول ۱- میانگین (\pm SE) روزهای سپری شده برای هر مرحله زندگی زنبور ماده *Encarsia formosa* روی پوره‌های سالم سفیدبالک و تیمار شده با قارچ *Lecanicillium longisporum* در بازه‌های زمانی مختلف

Table1. Mean (\pm SE) of days spent for each stage of *Encarsia formosa* females on intact and treated nymphs of white fly by *Lecanicillium longisporum* at different time intervals

duration (days)	Control	0 hour after treatment	24 hour after treatment	48 hour after treatment	72 hour after treatment	F	df	p
Egg+Larva	9.9 \pm 0.9a	10.2 \pm 0.25ab	10.8 \pm 0.13bc	10.6 \pm 0.94bc	11.1 \pm 0.16c	9.49	195	<0.001
Pupa	4.4 \pm 0.59a	4.8 \pm 0.1ab	5.1 \pm 0.11b	5.2 \pm 0.13c	5.3 \pm 0.12c	9.52	195	<0.001
Preadult	14.3 \pm 0.15a	14.98 \pm 0.19b	15.8 \pm 0.17c	15.9 \pm 0.22c	16.3 \pm 0.18c	19.13	195	<0.001
Adult	8.1 \pm 0.21a	7.7 \pm 0.29ab	6.9 \pm 0.24bc	6.4 \pm 0.23cd	5.5 \pm 0.33cd	15.52	195	<0.001

Means with different letter in each row are significantly different at 5% (using F-LSD post-hoc test)


جدول ۲- میانگین (\pm SE) پارامترهای زیستی زنبور ماده *Encarsia formosa* روی پوره‌های سفیدبالک سالم و تیمار شده با قارچ

در بازه‌های زمانی مختلف، مقادیر F و p مربوط به مقایسه میانگین و df: درجه آزادی

Table 2. Means of life table parameters of *Encarsia formosa* females on intact and treated nymphs of white fly by *Lecanicillium longisporum* at different time intervals

parameter	Control	0 hour after treatment	24 hours after treatment	48 hours after treatment	72 hours after treatment	F	df	p
R ₀	41.75 \pm 1.23a	37.45 \pm 1.35b	30.22 \pm 1.06b	29.52 \pm 1.4c	24.23 \pm 1.31d	26.86	195	<0.001
GRR	43.42 \pm 1.25a	42.68 \pm 1.29ab	33.36 \pm 1.08bc	36.59 \pm 4.07cd	30.42 \pm 1.6d	7.68	195	<0.001
r _m	0.203 \pm 0.002a	0.191 \pm 0.002b	0.175 \pm 0.001c	0.174 \pm 0.003c	0.161 \pm 0.003d	39.49	195	<0.001
T	18.32 \pm 0.16a	18.95 \pm 0.20b	19.53 \pm 0.19bc	19.44 \pm 0.24bc	19.79 \pm 0.22c	8.02	195	<0.001
λ	1.22 \pm 0.002a	1.21 \pm 0.002b	1.19 \pm 0.002b	1.19 \pm 0.003c	1.17 \pm 0.003d	39.03	195	<0.001
Total fecundity	41.75 \pm 1.23a	37.45 \pm 1.35a	30.32 \pm 1.08b	30.27 \pm 1.4b	24.24 \pm 1.6c	25.21	195	<0.001

Means with different letter in each row are significantly different at 5% level (using F-LSD post-hoc test)



شکل ۱- منحنی بقای ویژه سن (l_x)، منحنی باروری ویژه سن *Encarsia formosa* (m_x) روی پوره‌های سالم و آلوده به قارچ *Lecanicillium longisporum*

Figure 1. Survival rate (l_x) and number of females produced per female per day (m_x) of *Encarsia formosa* on intact and treated nymphs of white fly at four time intervals

References

- Askary, H., and Ajam-Hassani, M.** 2008. Effect of *Lecanicillium longisporum* (Deut.: Moniliales) on longevity, fecundity and mating behavior of *Aphidius nigripes* (Hym.:Aphilinidae). **Journal of Plant Pests and Disease** 76(2): 15-29 (In Farsi).
- Askary, H., Carriere Y., Belange, R. R. and Brodeur, J.** 1998. Pathogenicity of the fungus *Verticillium lecanii* to aphids and powdery mildew. **Biocontrol Science and Technology** 8: 23-32.
- Barbara, D. and Clewes, E.** 2003. Plant pathogenic *Verticillium* species: how many of them are there?" **Molecular Plant Pathology** 4: 297-305.
- Baverstock, J., Alderson, P. G. and Pell, J. K.** 2005. Influence of the aphid pathogen *Pandora neoaphidis* on the foraging behavior of the aphid parasitoid *Aphidius ervi*. **Ecological Entomology** 30: 665-672.
- Behdad, A.** 1987. Pests and diseases of forest trees and shrubs and ornamental plants of Iran. Sepehr Press, Tehran, pp. 824. (In Farsi).
- Boisclair, J., Brueren, G. J. and van Lenteren, J. C.** 1990. Can *Bemisia tabaci* be controlled with *Encarsia formosa*? **WPRS bulletin** 5: 32-35.
- Brobyn, P. J., Clark, S. J. and Wilding, N.** 1988. The effect of fungus infection of *Metopolophium dirhodum* (Hom.: Aphididae) on the oviposition behaviour of the aphid parasitoid *Aphidius rhopalosiphii* (Hym.: Aphidiidae). **Entomophaga** 33: 333-338.
- Chi, H.** 1988. Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rate among individuals. **Environmental Entomology** 17: 26-34.
- Chi, H.** 2008. TWOSEX-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. from <http://140.120.197.173/Ecology/Download/Twosex-MSChart.zip>.
- Chi, H. and Liu, H.** 1985. Two new methods for the study of insect population ecology. **Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica** 24: 225-240.
- Cuthbertson, A. G. S. and Walters, K. F. A.** 2005. Pathogenicity of the entomopathogenic fungus *Lecanicillium muscarium* against the sweet potato whitefly *Bemisia tabaci* under laboratory and glasshouse conditions. **Mycopathology** 160(2): 315-319.
- Cuthbertson, A. G. S., Blackburn, L. F., Northing, P., Luo, W., Cannon, R. J. C. and Walters, K. F. A.** 2008. Further compatibility tests of the entomopathogenic fungus *Lecanicillium muscarium* with conventional insecticide products for control of sweet potato whitefly, *Bemisia tabaci* on poinsettia plants. **Journal of Insect Science** 15(4): 355-360.
- Farhadi, R., Allahyari, H., Rasekh, A., Aldaghi, M. and Farhudi, F.** 2011. Comparison of life table parameters of *Hippodamia variegata* (Col.: Coccinellidae) and *Aphis fabae* (Hem.: Aphididae). **Journal of Knowledge of Iranian Plant Protection** 42(2): 209-215. (In Farsi).
- Fatiha, L., Huang, Z., Ren, S. X. and Ali, S.** 2008. Effect of *Verticillium lecanii* on biological characteristics and life tables of *Serangium japonicum* (Coleoptera:Coccinellidae), a predator of whiteflies under laboratory conditions. **Journal of Insect Science** 15: 327-333.
- Fransen, J. J. and Van Lenteren, J. C.** 1993. Host selection and survival of the parasitoid *Encarsia formosa* on greenhouse whitefly, *Trialeurodes vaporariorum*, in the presence of hosts infected with the fungus *Aschersonia aleyrodis*. **Entomologia Experimentalis et Applicata** 69(3): 239-249.
- Fransen, J. J. and Van Lenteren, J. C.** 1994. Survival of the parasitoid *Encarsia formosa* after treatment of parasitized greenhouse whitefly larvae with fungal spores of *Aschersonia aleyrodis*. **Entomologia Experimentalis et Applicata** 71(3): 235-243.
- Hall, R. A.** 1981. The fungus *Verticillium lecanii* as a microbial insecticide against aphids and scales. In Burges, H. D. (Ed.). *Microbial Control of Pests and Plant Diseases*. Academic Press, London. pp. 483-498.
- Karimi, J.** 1999. Virulence of *Beauveria bassiana* on *Trialeurodes vaporariorum*. MSc. thesis. University of Tehran. 67 pp. (In Farsi).
- Koike, N., Hyakumachi, M., Ageyama, K. K., Tsuyumu, S. and Doke, N.** 2001. Induction of systemic resistance in cucumber against several diseases by plant growth promoting fungi: lignification and superoxide generation. **European Journal of Plant Pathology** 107: 523-533.

- Lacey, L. A., Mesquita, A. L. M., Mercadier, G., Debire, R., Kazmer, D. J. and Leclant, F.** 1997. Acute and sublethal activity of the entomopathogenic fungus *Paecilomyces fumosoroseus* (Deuteromycotina: Hyphomycetes) on adult *Aphelinus asychis* (Hymenoptera: Aphelinidae). **Environmental Entomology** 26: 1452-1460.
- Liu, S. S.** 1990. The relationship between the age at parasitization and parasite impact in *Myzus persicae*. **Acta Entomologica Sinica** 33: 430-436.
- Mesquita, A. L. M. and Lacey, L. A.** 2001. Interactions among the entomopathogenic fungus, *Paecilomyces fumosoroseus* (Deuteromycotina: Hyphomycetes), the parasitoid, *Aphelinus asychis* (Hymenoptera: Aphelinidae) and their aphid host. **Biological Control** 22: 51-59.
- Meyer, S. L. F., Huettel, R. N., Sayre, R. M.** 1990. Isolation of fungi from *Heterodera glycines* and in vitro bioassays for their antagonism to eggs. **Journal of Nematology** 22: 532-537.
- Miller, T. C., Gubler, W. D., Laemmlen, F. F., Geng, S., Rizzo, D. M.** 2004. Potential for using *Lecanicillium lecanii* for suppression of strawberry powdery mildew. **Biocontrol Science and Technology** 14: 215-220.
- Nagata, R. T., Wilkison, L. M. and Nuessly, G. S.** 1998. Longevity, fecundity, and leaf stippling of *Liriomyza trifolii* (Diptera: Agromyzidae) as affected by lettuce cultivar and supplemental feeding. **Journal of Economic Entomology** 91: 999-1004.
- Nechols, J. R. and Tauber, M. J.** 1977. Age-specific interaction between the greenhouse whitefly and *Encarsia formosa*: influence of host on the parasite's oviposition and development. **Environmental Entomology** 6: 143-149.
- Nell, H. W., Sevenster-Van der Lelie, L. A., Woets, J. and van Lenteren, J. C.** 1976. The parasite-host relationship between *Encarsia formosa* (Hymenoptera: Aphelinidae) and *Trialeurodes vaporariorum* (Homoptera: Aleyrodidae). II. Selection of host stages for oviposition and feeding by the parasite. **Zeitschrift für Angewandte Entomologie** 81: 372-376.
- Nombela, G., Beitia, F. and Muñiz, M.** 2000. Variation in tomato host response to *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae) in relation to acyl sugar content and presence of the nematode and potato aphid resistance gene Mi. **Bulletin of Entomological Research** 90: 161-167.
- Powell, W., Wilding, N., Brobyn, P. J. and Clark, S. J.** 1986. Interference between parasitoids [Hym.: Aphidiidae] and fungi [Entomophthorales] attacking cereal aphids. **Entomophaga** 31: 293-302.
- Qiu, Y.T., van Lenteren, J. C., Drost, Y. C. and Posthuma-Doodeman, C. J. A.** 2004. Life-history parameters of *Encarsia formosa*, *Eretmocerus eremicus* and *E. mundus*, aphelinid parasitoids of *Bemisia argentifolii* (Hemiptera: Aleyrodidae). **European Journal of Entomology** 101(1): 83-94.
- Rashki, M., Kharazi-Pakdel, A., Allahyari, H. and van Alphen, J. J. M.** 2009. Interactions among the entomopathogenic fungus, *Beauveria bassiana* (Ascomycota: Hypocreales), the parasitoid, *Aphidius matricariae* (Hymenoptera: Braconidae) and its host, *Myzus persicae* (Homoptera: Aphididae). **Biological Control** 50: 324-328.
- Roy, H. E. and Pell, J. K.** 2000. Interactions between entomopathogenic fungi and other natural enemies: Implications for biological control. **Biocontrol Science and Technology** 10: 737-752.
- Roy, H. E., Baverstock, J., Ware, R. L., Clark, S. J., Majerus, M. E. N., Baverstock, K. E. and Pell, J. K.** 2008. Intraguild predation of the aphid pathogenic fungus *Pandora neoaphidis* by the invasive coccinellid *Harmonia axyridis*. **Ecological Entomology** 33: 175-182.
- Roy, H. E., Brown, P. and Majerus, M. E. N.** 2006. *Harmonia axyridis*: a successful biocontrol agent or an invasive threat? In Eilenberg, J. and Hokkanen, H. (Eds.) An ecological and societal approach to biological control. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp 295-309.
- Rumpf, S., Frampton, C. and Dietrich, D. R.** 1998. Effects of conventional insecticides and insect growth regulators on fecundity and other life-table parameters of *Micromus tasmaniae* (Neuroptera: Hemerobiidae). **Journal of Economic Entomology** 91: 34-40.
- Salama, H. S., Aboul-Ela, R., El-Moursy A. and Abdel-Razek, A.** 1991a. Biology and development of some stored grain pests as affected by d-endotoxin and b-exotoxin of *Bacillus thuringiensis*. **Biocontrol Science and Technology** 1: 281-287.

- Salama, H. S., El-Moursy, A., Zaki, F. N., Aboul-Ela, R. and Abdel-Razek, A.** 1991b. Parasites and predators of the meal moth *Plodia interpunctella* Hbn. as affected by *Bacillus thuringiensis* Berl. **Journal of Applied Entomology** 112: 244-253.
- Scopes, N. E. A.** 1970. Control of *Myzus persicae* on year round chrysanthemums by introducing aphids parasitized by *Aphidius matricariae* into boxes of rooted cuttings. **Annals of Applied Biology** 66: 323-27.
- Van Alpen, J. J. M., Nell, H. W. and Sevenster-van Der Lelie, L. A.** 1976. The parasite-host relationship between *Encarsia formosa* (Hym., Aphelinidae) and *Trialeurodes vaporariorum* (Hom., Aleyrodidae). The importance of host feeding in as a mortality factor in greenhouse whitefly nymphs. **IOBC-WPRS Bulletin** 4: 165-169.
- Van Lenteren, J. C.** 1995. Integrated pest management in protected crops. In Dent, D.(Ed.). Integrated pest management. Chapman and Hall, London. pp. 311-43.
- Van Lenteren, J. C. and Woets, J.** 1988. Biological and integrated pest control in greenhouses. **Annual Review of Entomology** 33: 239-269.
- Verhaar, M. A., Hijwegen, T. and Zadoks, J. C.** 1996. Glasshouse experiments on biocontrol of cucumber powdery mildew (*Sphaerotheca fuliginea*) by the mycoparasites *Vericillium lecanii* and *Sporothrix rugulosa*. **Biological Control** 6: 353-360.
- Wekesa, V. W., Moraes, G. J., Knapp, M. and Delalibera, I.** 2007. Interactions of two natural enemies of *Tetranychus evansi*, the fungal pathogen *Neozygites floridana* (Zygomycetes: Entomophthorales) and the predatory mite, *Phytoseiulus longipes* (Acari: Phytoseiidae). **Biological Control** 41: 408-414.
- Wyatt, I. J. and Brown, S. J.** 1977. The influence of light intensity, daylength and temperature on increase rates of four glasshouse aphids. **Journal of Applied Ecology** 14: 391-399.
- Xu, J. H. and Feng, M. G.** 2002. *Pandora delphacis* (Entomophthorales: Entomophthoraceae) infection affects the fecundity and population dynamics of *Myzus persicae* (Homoptera: Aphididae) at varying regimes of temperature and relative humidity in the laboratory. **Biological Control** 25: 85-91.

Effect of fungus, *Lecanicillium longisporum* (Hypocreales: Clavicipitaceae) on life table parameters of *Encarsia formosa* (Hymenoptera: Aphelinidae)

M. Fazeli-Dinan^{*1}, R. Talaei-Hassanloui², H. Allahyari³, A. Kharazi-Pakdeland⁴ S. H. Goldansaz⁵

1,2,3,4,5. PhD . Student, Associate Professor, Associate Professor, Professor and Associate Professor, respectively, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

(Received: July 22, 2012- Accepted: September 21, 2012)

Abstract

Effects of fungus, *Lecanicillium longisporum* was studied on reproductive capacity of *Encarsia formosa* at laboratory conditions. Fungal infection on whiteflies was carried out using 9.5×10^5 conidia/ml of fungus on the third instar of whitefly exposing to parasitoid at four different time intervals; 0, 24, 48 and 72 hours post-inoculation. Longevity, pre-oviposition period, oviposition period and other parameters were evaluated and compared. Results showed that the intrinsic rate of increase (r_m) for control was 0.203 day^{-1} . There was a significant decreasing trend on the intrinsic rate of population decrease at different time intervals. Other life table parameters consist of net reproductive ratio (R_0), gross reproductive rate (GRR), cohort generation time (T), and finite rate of increase (λ) for control were 41.75, 43.42, 18.32 and 1.22, respectively. The results indicated that infected hosts caused decreased reproductive potential of parasitoids.

Key words: life table parameter; time interval; intrinsic rate of increase; *Encarsia formosa*; *Lecanicillium*

*Corresponding author: fazelidinan@gmail.com