

## بررسی تنوع زیستی بال ریشکداران (Insecta: Thysanoptera) باغ‌های یاسوج و سی‌سخت

فیسه جهانگیری سی‌سخت<sup>۱</sup>، لیلا رمضانی<sup>۲</sup> و بهزاد حبیب‌پور<sup>\*۳</sup>

۱ و ۳ - گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۲ - گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱۲/۱۹ تاریخ پذیرش: ۹۳/۴/۳۱)

### چکیده

تنوع زیستی از مؤلفه‌های اساسی یک جامعه‌ی زیستی بوده و بسیاری از محققین در تلاشند تا با حفظ تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی در اکوسیستم کشاورزی، به سمت کشاورزی پایدار پیش رفته و باعث سلامت محیط زیست شوند. بهمنظور بررسی تنوع زیستی بال ریشکداران باغ‌های یاسوج و سی‌سخت، نمونه‌برداری‌هایی به طور منظم و هر دو هفته یکبار از فروردین ماه تا مهرماه سال ۱۳۹۱ از باغ‌های میوه‌ی دانهدار و هسته‌دار به عمل آمد. نمونه‌ها با استفاده از روش تکاندن در سینی سفید جمع‌آوری شده، سپس به شیشه‌ی محتوى الكل ۷۰ درصد منتقل شدند. پس از انتقال به آزمایشگاه و تهیه‌ی اسلامی میکروسکوپی از آن‌ها در سطح گونه شناسایی شدند. به منظور ارزیابی تنوع زیستی از شاخص شانز-وینر و برای ارزیابی یکنواختی از شاخص پیئلو استفاده شد. با توجه به محاسبات میزان شاخص تنوع و یکنواختی در یاسوج به ترتیب  $0.3702 \pm 0.599$  و  $0.1236 \pm 0.5339$  بوده و در سی‌سخت شاخص تنوع و یکنواختی به ترتیب  $0.2892 \pm 0.9256$  و  $0.9655 \pm 0.9209$  به دست آمد. نتایج نشان داد که تنوع و یکنواختی بال ریشکداران در یاسوج به طور معنی داری بیشتر از سی‌سخت است.

**واژه‌های کلیدی:** تنوع زیستی، شاخص پیئلو، شاخص شانز-وینر، بال ریشکداران، کهگیلویه و بویراحمد.

توان توزیع گونه‌ها را در محیط بررسی کرد و با تأکید بر پویایی بوم‌سازگان توصیه‌های مدیریتی مناسب را ارائه نمود (Van der Maarel, 1988). کنترل مؤثر آفات نیاز به دانش کافی درباره‌ی تغییرات جمعیت آنها دارد. و عوامل اقلیمی محیط به طور مستقیم و غیر مستقیم روی جمعیت گیاهان و حشرات تأثیرگذار است. در هر منطقه نوع خاصی از اکوسیستم وجود داشته و هر اکوسیستم گونه‌های مخصوص به خود را دارد. استان کهگلوبه و بویراحمد با مساحت ۱۶۲۶۴ کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد. ناحیه‌ای سردسیر که شهرهای یاسوج و سی سخت در آن قرار دارد، تقریباً نیمی از کل مساحت استان را در بر گرفته است و قسمت شمال و شرق استان را به خود اختصاص داده است (Statistical Yearbook, 2011).

تنوع زیستی بالریشکداران در تعدادی از مناطق ایران توسط برخی از محققین بررسی شده است. رمضانی (Ramezani, 2010) تنوع زیستی بالریشکداران مزارع گندم در استان خوزستان را بررسی نمود. آزرمی و همکاران (Azarmi et al., 2010) طی پژوهش‌های خود تنوع زیستی بالریشکداران استان فارس را مورد بررسی قرار دادند.

برای درک بهتر تأثیر حفظ تنوع زیستی بر پایداری اکوسیستم‌های کشاورزی ضروری است اطلاعاتی از ترکیب گونه‌های جانوری منطقه کسب شود. در دو منطقه‌ی یاسوج و سی سخت باغهای میوه‌ی دانه‌دار و هسته‌دار به صورت گسترده کشت می‌شوند. از سوی دیگر بالریشکداران به وفور در این باغها یافت می‌شوند، لذا تعیین وضعیت تنوع زیستی این حشرات به منظور مدیریت آفات ضروری به نظر می‌رسد. در این بررسی تنوع زیستی بالریشکداران باغهای میوه‌ی یاسوج و سی سخت مورد بررسی قرار گرفته است.

## مواد و روش‌ها

از فروردین تا شهریور سال ۱۳۹۱ از باغهای میوه‌ی یاسوج و سی سخت بازدید به عمل آمد. در هر دو منطقه یک باغ جهت مقایسه‌ی تنوع زیستی در نظر گرفته شد.

## مقدمه

بالریشکداران دارای بیش از ۶۰۰۰ گونه‌ی توصیف شده در سراسر جهان هستند. این راسته دارای ۹ خانواده متعلق به دو زیرراسته می‌باشد (Mound, 2011a). تاکنون حدود ۲۰۱ گونه بالریشکدار متعلق به ۷۰ جنس و ۵ خانواده از ایران گزارش شده است (Minaei, 2013). این حشرات معمولاً گیاه‌خوار بوده، از شیره‌ی گیاهی تغذیه می‌کنند و می‌توانند به صورت گرده‌افشان، شکارگر و تجزیه‌کننده عمل کنند. همچنین برخی از آن‌ها نیز از Mound, 2009 ; Bhatti, 1974 (Wang and Tong, 2011) بالریشکداران از مهم‌ترین اجزای فون حشرات خاکزی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر تعدادی از جنس‌ها مانند *Thrips* و *Frankliniella* از گل‌های مختلف تغذیه کرده و از آفات مهم گیاهان می‌باشد (Sukhoruchenko and Dolzhenko, 2008).

از بالریشکداران مانند گونه‌های جنس *Scolothrips* نقش مهمی در کنترل طغیان کنه‌های تارتان ایفا می‌کند (Mound, 2011b). باغ‌ها به دلیل در برداشتن میزان‌های مختلف گیاهی، زیستگاه‌های مناسبی برای گونه‌های متعدد بندپایان می‌باشند. مطالعه‌ی تنوع زیستی در باغ‌ها می‌تواند شاخص مناسبی جهت اندازه‌گیری سلامت محیط و میزان سازگاری آن نسبت به شرایط نامساعد باشد. مطالعات نشان داده که اندازه‌گیری تنوع نقش مهمی در ارزیابی محیط دارد. با اندازه‌گیری تنوع زیستی می‌توان توزیع گونه‌ها را در محیط بررسی کرد و با تأکید بر پویایی بوم‌سازگان توصیه‌های مدیریتی مناسب را ارائه نمود. یکنواختی چگونگی توزیع فراوانی افراد را در بین گونه‌ها نمایش می‌دهد؛ به عبارت دیگر، یکنواختی میزان تعادل در فراوانی گونه‌ها است (Ejtehadi et al., 2009).

نشان می‌دهد کاهش تنوع زیستی محیط‌های کشاورزی، رابطه‌ی مستقیمی با نوع سیستم‌های کشاورزی دارد (Benton et al., 2003).

1. Wang  
2. Tong

## نتایج

در این بررسی تعداد ۲۰ گونه بالریشکدار متعلق به ۱۰ جنس و ۳ خانواده از باغات یاسوج و سی سخت جمع آوری و شناسایی شدند (جدول ۱). پس از نمونه برداری و تهیی اسلامید، بالریشکداران شمارش شده و فراوانی نسبی آنها به دست آمد (جدول ۱). با توجه به جدول شماره‌ی ۱، در منطقه‌ی سی سخت پیشترین فراوانی (٪۷۰/۶) به گونه‌ی *F.* *occidentalis* اختصاص داشته و پس از آن *T. tabaci* با فراوانی نسبی ٪۱۸/۸ و *T. meridionalis* با فراوانی نسبی ٪۱۸/۸ در منطقه‌ی یاسوج گونه‌ی *T. meridionalis* با آن گونه‌های *T. tabaci* ٪۶۵/۲۱ گونه‌ی غالب و پس از آن گونه‌های *H. reuteri* ٪۷/۹۵ در مرتبه‌ی دوم و سوم قرار گرفتند. بررسی روند تجمع گونه‌ای (جدول شماره ۲ و ۳) در دو منطقه نشان می‌دهد نرخ افزایش تعداد گونه‌ها با افزایش تعداد نمونه برداری کم شده و بیانگر این نکته است که حداکثر تعداد گونه‌ی موجود در باغات یاسوج و سی سخت جمع آوری شده است. لذا نمونه برداری به تعداد کافی صورت گرفته و نمونه برداری بیشتر باعث افزایش تعداد گونه نخواهد شد. شاخص‌های تنوع و یکنواختی برای گونه‌های جمع آوری شده در دو منطقه یاسوج و سی سخت محاسبه شد (جدول‌های ۲ و ۳). شاخص تنوع شانون در یاسوج در تمام تاریخ‌های جمع آوری نمونه محاسبه شد و در نهایت شاخص تنوع کل در این منطقه ۰/۳۷۰۲ ± ۰/۵۹۹۱ به دست آمد. همچنین یکنواختی در یاسوج با استفاده از شاخص یکنواختی پیئلو ۰/۱۲۳۶ ± ۰/۵۳۳۹ و محسوبه شد. در سی سخت شاخص تنوع کل ۰/۹۲۵۶ ± ۰/۰۹۶۵۵ و یکنواختی ۰/۰۳۰۹ ± ۰/۰۹۶۵۵ به دست آمد.

برای اندازه‌گیری تنوع زیستی نمونه برداری به صورت دو هفته یک بار صورت گرفت. نمونه‌های بالریشکداران از روی درختان انگور<sup>۳</sup>، هلو<sup>۴</sup>، ارقام سیب<sup>۵</sup> (سیب قرمز، سیب زرد، سیب گلاب بهاره و سیب گلاب پاییزه) و آلو<sup>۶</sup> جمع آوری شدند. در هر هکتار باغ ۲۰ درخت بصورت تصادفی انتخاب شد. از هر درخت چند شاخه به طور تصادفی و در ارتفاع متفاوت درخت، انتخاب شده و در سینی سفید تکان داده شد. نمونه‌ها به شیشه‌ی حاوی الکل ۷۰ درصد انتقال داده و بعد به آزمایشگاه منتقل گردید. با استفاده از محلول هویر از آنها اسلامید میکروسکوپی تهیه شد. نمونه‌ها با استفاده از کلیدهای موجود (Mound et al., 1976; Mound and Kibby, 1998; Vierbergen, 1995 تأیید نزد دکتر مینایی (دانشکده‌ی کشاورزی شیراز) ارسال شدند. در بررسی تنوع زیستی از شاخص تنوع شانون-وینر (معادله ۱) و شاخص یکنواختی پیئلو (معادله ۲) و SDR (Species Diversity and Richness) نرم افزار استفاده شد.

معادله (۱)

$$H' = - \sum_{i=1}^s P_i \ln P_i = - \sum_{i=1}^s (P_i) (\log_2 P_i)$$

$P_i$ : سهم افراد در گونه‌ی آنم نسبت به کل نمونه که به صورت  $\frac{n_i}{N}$  تعریف می‌شود.  
 $S$ : تعداد گونه‌ها.  
 معادله (۲)

$$E_1 = \frac{H'}{\ln(S)} = \frac{\ln(N_1)}{\ln(N_0)}$$

(S): تعداد گونه‌ها  
 $N_1$ : شاخص نمایی شانون

3. *Vitis vinifera*  
 4. *Prunus persica*  
 5. *Malus domestica*  
 6. *Prunus domestica*

جدول ۱- فراوانی گونه‌های بالریشکدار جمع آوری شده در باغ‌های یاسوج و سی‌سخت در سال ۱۳۹۱

Table1. Abundance of thrips species collected in the orchards of Yasouj and Sisakht during 2012

Species	Sisakht		Yasouj	
	frequency	The relative frequency	frequency	The relative frequency
<i>Aelothrips fasciatus</i> Linnaeus	0	0	28	3.47
<i>Aelothrips intermedius</i> Bagnall	0	0	18	2.23
<i>Aelothrips mongolicus</i> Pelikan	0	0	2	0.24
<i>Aelothrips tenuicornis</i> Bagnall	0	0	1	0.12
<i>Frankliniella occidentalis</i> Karny	473	70.59	27	3.35
<i>Frankliniella tenuicornis</i> Uzel	0	0	1	0.12
<i>Mycterothrips tschirkunae</i> Yakhontov	0	0	7	0.86
<i>Scolothrips longicornis</i> Periesner	3	0.44	5	0.62
<i>Sitothrips arabicus</i> Priesner	0	0	1	0.12
<i>Taeniothrips inconsequense</i> Uzel	0	0	2	0.24
<i>Tenothrips frici</i> Uzel	1	0.14	19	2.36
<i>Thrips atratus</i> Haliday	1	0.14	0	0
<i>Thrips italicus</i> Bagnall	1	0.14	1	0.12
<i>Thrips major</i> Uzel	0	0	10	1.24
<i>Thrips meridionalis</i> Periesner	126	18.80	525	65.21
<i>Thrips minutissimus</i> Linnaeus	4	0.59	20	2.48
<i>Thrips tabaci</i> Lindeman	43	6.41	73	9.06
<i>Thrips trybomi</i> Karny	7	1.04	1	0.12
<i>Haplothrips reuteri</i> Karny	10	1.49	64	7.95
<i>Liothrips pragensis</i> Uzel	1	0.14	0	0
Total	670	100	805	100

### بحث

در پژوهشی اثر پوشش گیاهی در فراوانی و تنوع زیستی گونه‌های زنجرک‌های Cicadellidae زبورهای پارازیتوئید، ترپس غربی گل (*Frankliniella occidentalis*) و شکارگرهای عمومی در تاکستان‌های ارگانیک در شمال کالیفرنیا را بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد حشرات مورد مطالعه تمایل بیشتری به حضور در قسمت‌های دارای پوشش گیاهی داشته و همچنین وجود زیستگاه‌های بیشتر، کلتی شکارگرهای افزایش می‌دهد.

با توجه به جدول‌های ۲ و ۳ بالاترین میزان شاخص تنوع در یاسوج اوایل خرداد و در سی‌سخت در اردیبهشت ماه می‌باشد. پایین بودن شاخص تنوع در اردیبهشت ماه در یاسوج علی‌رغم اوج گلدهی درختان می‌تواند به دلیل طغیان گونه‌ی *T. meridionalis* باشد. علوی و همکاران (Alavi et al., 2012) از گونه‌ی *T. meridionalis* به عنوان بالریشکدار خسارت‌زای درختان میوه‌ی سردسیری در استان فارس نام می‌برد. نیکولس<sup>۷</sup> و همکاران (Nicholls

7. Nichollas

همچنین آلتیری<sup>۸</sup> (Altieri, 1990) عنوان می‌کند افزایش آفات به گسترش تک کشتی محصولات کشاورزی نسبت به پوشش گیاهی طبیعی در منطقه مرتبط است که در نتیجه‌ی کاهش دشمنان طبیعی است. میزان شاخص تنوع در یاسوچ نسبت به سی سخت بیشتر بوده که می‌تواند به دلیل تنوع بیشتر پوشش گیاهی در یاسوچ باشد. چرا که در منطقه‌ی سی سخت محصولات باغ‌ها به صورت یکنواخت و گسترده کشت شده ولی در یاسوچ اطراف باغ‌ها و بین آنها مزارع مختلف نیز دیده می‌شود. *T. meridonalis* با تراکم زیادی روی درختان مشاهده شد که می‌تواند به دلیل گل‌زی و پلی‌فائز بودن این گونه باشد. گونه‌ی *T. meridionalis* در جنوب فرانسه و غرب ترکیه به عنوان آفت درختان میوه نام برده شده است (Alavi *et al.*, 2012). تریپس غربی گل (*F. occidentalis*) به عنوان آفت مهم گلخانه‌ها از طریق خسارت مستقیم (تجذیه از قسمت‌های مختلف گیاه) و غیرمستقیم (انتقال ویروس‌ها) خسارت وارد می‌کند. با توجه به ظرفیت بالای تولید مثل افراد ماده، تکرار چرخه زندگی، پنهان شدن و محافظت از خود در برابر تماس با حشره‌کش‌ها و مقاومت در برابر برخی حشره‌کش‌ها؛ مدیریت این گونه مشکل می‌باشد (Raymond, 2009).

### سپاس‌گزاری

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر فراهم نمودن امکانات لازم برای تحقیق و همچنین از جناب آفای دکتر کامبیز مینایی (عضو هیات علمی بخش گیاه‌پزشکی دانشگاه شیراز) جهت شناسایی و تأیید گونه‌های بالریشکدار، تشکر می‌شود.

## جدول ۲- شاخص تنوع، یکنواختی و تعداد تجمعی گونه‌های بالریشکدار در یاسوج

Table 2. Cumulative number of species, diversity and evenness index of thrips species in Yasouj

Date	Cumulative number of species	Number of species	Pielou measure of evenness (J)	Variance for diversity	Shannon diversity (H) index
2012/4/15	7	7	0.40	0.022	1.20
2012/5/4	9	4	0.06	0.006	0.20
2012/5/12	14	10	0.30	0.006	0.91
2012/5/27	15	8	0.62	0.016	1.87
2012/6/12	17	8	0.51	0.018	1.54
2012/6/23	17	2	0.21	0.091	0.63
2012/7/16	18	3	0.24	0.090	0.73
2012/7/30	18	6	0.44	0.017	1.31
2012/8/17	18	2	0.23	0.125	0.69
2012/8/30	18	3	0.29	0.017	0.87
2012/9/17	18	5	0.44	0.030	1.33
2012/10/12	18	4	0.37	0.034	1.12
2012/10/18	18	7	0.52	0.020	1.55
Samples Index			0.5339		1.599
Jack. SE.			0.1236		0.3702

## جدول ۳- برآورد شاخص تنوع و یکنواختی و تعداد تجمعی گونه‌های بالریشکدار در سی سخت

Table 3. Cumulative number of species, diversity and evenness index of thrips species in Sisakh

Date	Cumulative number of species	Number of species	Pielou measure of evenness (J)	Variance for diversity	Shannon diversity index (H)
2012/4/10	1	1	0	0	0
2012/4/22	3	3	0.07	0.015	0.22
2012/5/09	7	6	0.44	0.015	1.342
2012/5/29	9	6	0.26	0.011	0.80
2012/6/10	9	3	0.07	0.006	0.22
2012/7/17	10	3	0.03	0.004	0.11
2012/7/29	10	3	0.05	0.005	0.16
2012/8/17	10	3	0.06	0.010	0.18
2012/9/01	11	4	0.14	0.035	0.44
2012/9/24	11	2	0.02	0.002	0.061
2012/10/3 Samples Index	11	3	0.11 0.309	0.032	0.34 0.9256
Jack. SE.		0.09655		0.2892	

## References

- Alavi, J., Zibaei, K. and Sajjadi, M. 2012. *Thrips meridionalis* (Thysanoptera: Thripidae) a pest of stone fruit trees in Fars province. Proceeding of 20<sup>th</sup> Iranian Plant Protection Congress. 25-28 August. Tehran. pp. 861 (In Farsi).
- Altieri, M. A. 1990. Increasing biodiversity to improve insect pest management in agro-ecosystems. Biodiversity of microorganisms and invertebrates: its role in sustainable agriculture. Proceedings of the First Workshop on the Ecological Foundations of Sustainable Agriculture (WEFSA 1), 26-27 July. London, UK. pp. 165-182.

- Azarmi, E., Saghaei, N., Alemansoor, H. and Fallahzadeh, M.** 2010. Biodiversity of Thysanoptera in the Fars province of Iran. Proceedings of 19<sup>th</sup> Iranian Plant Protection Congress. 31 July- 3 August. Tehran. pp. 125. (In Farsi).
- Benton, T. G., Vickery, J. A., and Wilson, J. D.** 2003. Farmland biodiversity: is habitat heterogeneity the key. **Trends in Ecology and Evolution** 18(4): 182–188.
- Bhatti, J. S.** 1974. The genus Organothrips. **Oriental Insects** 8: 147–155.
- Ejtehadi, H., Sepehry, A. and Akkafi, H. R.** 2009. Method of Measuring Biodiversity. Ferdowsi University Of Mashhad Publication. 228 pp. (In Farsi).
- Minaei, K.** 2013. Thrips (Insecta, Thysanoptera) of Iran: a revised and updated checklist. **Zookeys** 330: 53-74.
- Mound, L. A., Morison, G. D., Pitkin, B. R. and Palmer, J. M.** 1976. Thysanoptera. Handbooks for the Identification of British Insects. 1(11): 1-79.
- Mound, L. A. & Kibby, G.** 1998. Thysanoptera an Identification Guide ( 2<sup>nd</sup> ed). CAB International, Wallingford, Oxford, UK. 70 pp.
- Mound, L. A.** 2009. An illustrated key to the genera of Thripinae (Thysanoptera) from South East Asia. **Zootaxa** 2265: 27-47.
- Mound, L. A.** 2011(a). Grass-dependent Tysanoptera of the family Tripidae from Australia. **Zootaxa** 3064: 1–40.
- Mound, L. A.** 2011(b). Species recognition in the genus *Scolothrips* (Tysanoptera, Tripidae), predators of leaf-feeding mites. **Zootaxa** 2797: 45–53.
- Nicholls, C. I., Parrella, M. and Altieri, M. A.** 2011. The effects of a vegetational corridor on the abundance and dispersal of insect biodiversity within a northern California organic vineyard. **Landscape Ecology**. 16:133-146.
- Ramezani, L.** 2010. Grain crops Thysanoptera, their biodiversity and population dynamics of dominant species of wheat crops in Khuzestan. PhD. Thesis. Shahid Chamran University, College of Agriculture. (In Farsi).
- Raymond, A. C.** 2009. Western flower thrips (*Frankliniella occidentalis*) management on ornamental crops grown in greenhouses: have we reached an impasse?. **Pest Technology** 3(1): 1-2.
- Statistical Yearbook 2011.** Governor Kohgiluyeh & Boyerahmad pp. 176-238. (In Farsi).
- Sukhoruchenko, G. I. and Dolzhenko, V.I.** 2008. Problems of resistance development in arthropod pests of agricultural crops in Russia. **Journal compilation, Bulletin** 38: 119-126.
- Van der Maarel, E.** (1988). Species diversity in plant Communities in relation to structure and dynamics. In: Diversity and pattern in plant Communities (eds. H. J. During, M. J. A. Werger and H. J. Williams), SPB Academic Publishing, The Hague, The Netherlands. pp. 1-14.
- Wang, J. and Tong, X.** 2011. Species diversity, seasonal dynamics, and vertical distribution of litter-dwelling thrips in an urban forest remnant of South China. **Journal of insect science**. 12(67): 1-12.

## Biodiversity survey of Thrips (Insecta: Thysanoptera) in Yasouj and Sisakht orchards

**N. Jahangiri Sisakht<sup>1</sup>, L. Ramezani<sup>2</sup> and B. Habibpour<sup>3\*</sup>**

1 and 2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahwaz,  
Iran. 2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ramin Agricultural and Natural  
Resources University, Mollasani, Ahwaz, Iran.

(Received: February 8, 2014- Accepted: July 22, 2014)

---

### Abstract

Biodiversity is an essential component of any natural biological community. To facilitate sustainable agriculture and enhance environmental health, many scientists work to preserve animal and plant species diversity. In this research, thrips biodiversity in Yasouj and Sisakht (Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Iran) pome and stone fruit orchards was studied. Sampling was performed every two weeks from April through October 2012. Samples were collected by shaking tree branches over a white tray, and then thrips were quickly collected and transferred into vials containing 70% ethanol. Thrips were placed on microscopic slides and identified to species level. To assess thrip biodiversity and evaluation of their evenness of distribution within orchards, the Shannon-Wiener and the Pielou indices were used, respectively. According to calculations, biodiversity and evenness indices were  $1.599 \pm 0.3702$  and  $0.5339 \pm 0.1236$ , and  $0.9256 \pm 0.2892$  and  $0.309 \pm 0.09655$ , in Yasouj and Sisakht orchards, respectively. These results indicated that species diversity and evenness of Thysanoptera in Yasouj orchards are significantly greater than in Sisakht orchards.

**Keywords:** Biodiversity, Pielou Index, Shannon-Wiener Index, Thysanoptera, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad.

---

\*Corresponding author: habibpour\_b@scu.ac.ir