

## مقاله کوتاه علمی

# شناسایی دشمنان طبیعی تریپس افرا (*Taeniothrips inconsequens* Uzel) در استان ایلام (Thripidae)

مجید میراب بالو<sup>۱\*</sup>

۱- گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

(تاریخ دریافت: ۹۵/۳/۱۳ تاریخ پذیرش: ۹۵/۸/۲۴)

## چکیده

تریپس افرا، (*Taeniothrips inconsequens* Uzel) (Thysanoptera: Thripidae) یکی از تریپس‌های مهم گیاه‌خوار روی درختان افرا ایلام می‌باشد که به تازگی باعث ایجاد خسارت روی این درختان شده است. در این تحقیق، دشمنان طبیعی این تریپس با نمونه‌برداری‌های ماهیانه در سال ۱۳۹۴ از درختان افرا کوههای گچان و مانشت جمع‌آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل نشان داد که دشمنان طبیعی شامل یک زنبور پارازیتوئید لارو تریپس (*Ceranisus menes* Walker) از خانواده Eulophidae، و ۱۲ حشره و کنه شکارگر از خانواده‌های زیر بود: خانواده Aeolothripidae [Aeolothrips intermedius Bagnall]، خانواده Haplothripidae [Haplothrips flavitibia Williams, Haplothrips ] Phlaeothripidae [Phlaeothrips longicornis Priesner] Anthocoris pilosus (Jakovlev), Orius laevigatus (Fieber), Orius niger ] Anthocoridae [globiceps Bagnall، خانواده Nabidae [Nabis ferus (L.)] Nabidae [Deraeocoris pallens (Reuter)] Miridae [(Wolff, 1811)، خانواده Chrysoperla carnea (Stephens)] Chrysopidae [Coccinella septempunctata (L.)] Coccinellidae خانواده Anystis baccarum (L.)] Anystidae و سن‌های جنس Orius بالاتر از دیگر دشمنان طبیعی بود. مجموع شکارگرها در طول دوره زیستی تریپس افرا روی درختان افرا حضور داشتند ولی جمعیت تریپس شکارگر *A. intermedius* و سن‌های جنس *Orius* بالاتر از دیگر دشمنان طبیعی بود.

**واژه‌های کلیدی:** تریپس افرا، دشمنان طبیعی، زنبور پارازیتوئید، زاگرس، ایلام.

شکارگرها نیز تاکنون بندپایان مختلفی در حال تغذیه از تریپس‌ها گزارش شده است که عمومی‌ترین آن‌ها متعلق به سن‌های خانواده‌های آنتوکوریده و میریده، لارو مگس‌های سیرفیده، و لارو بالتوری‌ها می‌باشد (Lewis, 1997).

در حال حاضر در رابطه با تریپس‌های مرتبط با درختان جنگلی زاگرس (استان ایلام)، گونه‌های مختلفی از تریپس‌های موجود روی درختان افرا توسط نگارنده جمع‌آوری و تغییرات جمعیت آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. از این‌حیث، با توجه به غالب بودن تریپس افرا روی این درختان، دشمنان طبیعی این آفت نیز جمع‌آوری و شناسایی شد که در این مقاله به آن‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که تاکنون هیچ گونه مطالعه‌ای در رابطه با دشمنان طبیعی این آفت در ایران صورت نگرفته است و این نتایج برای اولین بار ارائه می‌شود. در این رابطه، دشمنان طبیعی تریپس افرا در بخشی از جنگل‌های زاگرس واقع در استان ایلام (کوه مانشت با مشخصات جغرافیایی '41° N 33° 28.08" E 46° 27' 33.36" و ۲۶۵۰ متر ارتفاع از سطح دریا؛ و کوه گچان با مشخصات جغرافیایی '38° 29' 9.96" E 46° 29" 43.08" و ۲۳۳۰ متر ارتفاع از سطح دریا) در سال ۱۳۹۴ جمع‌آوری شد. شکارگرها جمع‌آوری شده به کمک تور حشره‌گیری جمع‌آوری و در کل ۷۰٪ قرار داده شدند و در آزمایشگاه، بسته به راسته شکارگر، از کل نمونه و یا از اندام تناسلي حشره نر اسلامی میکروسکوپی تهیه و با استفاده از کلیدهای مختلف، نسبت به شناسایی آن‌ها اقدام شد. همچنین تعدادی لارو تریپس افرا به آزمایشگاه منتقل و از آن‌ها تا خروج زنبورهای پارازیتوئید نگهداری شد.

در این بررسی، یک گونه زنبور پارازیتوئید لارو با نام علمی *Ceranisus menes* (Walker) از خانواده Eulophidae، روی لاروهای این آفت به تعداد کم جمع‌آوری شد. این پارازیتوئید دارای پراکنش وسیعی در دنیا بوده و همچنین میزان‌های متعددی برای آن گزارش شده است (Loomans, 2003). در ایران برای اولین بار از استان همدان (Tan et al., 2010) و در این تحقیق نیز برای اولین

#### مقدمه

جنگل‌های زاگرس در غرب ایران معادل ۴۰ درصد جنگل‌های کل کشور را دارا بوده و یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های ایران می‌باشد. گونه‌ی گیاهی غالب در جنگل‌های زاگرس را درختان بلوط تشکیل می‌دهند ولی در کنار آن، درختان دیگری از جمله بنه، زالزالک و گونه‌های Pourhashemi et al., (2004) مختلف افرا نیز وجود دارد (Mirzaei and Mirab-balou, 2015) که در بین حشرات آفت، تریپس‌های مختلفی در روی این درختان فعالیت دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در استان ایلام، تریپس افرا (*Taeniothrips inconsequens*) می‌باشد. این گونه در اروپا، آمریکا و برخی از کشورهای آسیایی پراکش دارد (Mirab-balou et al., 2011) و به تازگی نیز از کشورهای قطر (Mirab-balou et al., 2014) و چین (Mirab-balou et al., 2015) گزارش شده است. تریپس افرا در ایران برای اولین بار از تهران و پس از آن، از گیلان و همدان به صورت موردي جمع‌آوری و گزارش شده است (Mirab-balou, 2013). حشرات کامل این گونه تاکنون روی ۲۰۰ گونه گیاهی، و ۳۵ گونه درختی از جمله افرا، بلوط، راش، زبان‌گچشک، گلابی، و آلو جمع‌آوری شده‌اند. این گونه به طور جدی روی برگ‌های جوان و گل‌ها تغذیه نموده و در برخی موارد، باعث ریزش زودهنگام برگ‌های جوان می‌گردد (Teulon et al., 1994).

حرکت آهسته لاروهای تریپس روی گیاهان میزان باعث شده است تا طیف وسیعی از بندپایان شکارگر از آن‌ها تغذیه کنند، و همچنین تخم‌ها و لاروهای این آفت توسط پارازیتوئیدها مورد حمله قرار گیرند. پارازیتوئیدهای تخم Lewis (1973) ولی لاروها بیشتر توسط زنبورهای خانواده Eulophidae مورد حمله قرار می‌گیرند که به طور معمول *Megaphragma* بیشتر متعلق به جنس *Ceranisus* می‌باشد (Loomans, 2003) ولی لاروهای *Ceranisus* بیشتر توسط زنبورهای جنس *Megaphragma* صورت می‌گیرد (Loomans, 2003).

**۳. کفشدوزک‌های شکارگو:** کفشدوزک‌ها جزء حشرات بسیار مفید و مشهور می‌باشند که هم لاروها و هم حشرات کامل از هر گونه بندپایی که به دست می‌آورند تغذیه می‌کنند (Obrycki and Kring, 1998). در این مطالعه، تنها کفشدوزک هفت نقطه‌ای با نام علمی *Coccinella septempunctata* (L.) جمع‌آوری شد.

**۴. بالتویری‌های شکارگو:** در این بررسی، لاروهای گونه‌ی *Chrysoperla carnea* (Stephens) (خانواده‌ی Chrysopidae) در حال تغذیه از لاروهای تریپس افرا جمع‌آوری و شناسایی شدند. در حال حاضر، این گونه دارای جمعیت به نسبت خوبی در جنگل‌های زاگرس می‌باشد.

**۵. کنه شکارگو:** کنه‌ی (*Anystis baccarum* (L.)) از خانواده‌ی Anystidae به عنوان تنها کنه شکارگر روی درختان افرا با جمعیت‌های به نسبت پایینی در اواخر تابستان جمع‌آوری و شناسایی شد. این گونه در ایران دارای اهمیت بالایی بوده و در بیشتر مناطق به فراوانی یافت می‌شود (Khanjani and Mirab-balou, 2007).

افزایش روزافرون نگرانی‌های مردم در مورد اینست کاربرد آفت‌کش‌ها در کنترل آفات موجب توجه هر چه بیشتر به روش کنترل بیولوژیک در قالب برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات در اکوسیستم‌های مختلف شده است. در این تحقیق ۱۲ گونه حشره و یک گونه کنه به عنوان دشمن طبیعی تریپس افرا جمع‌آوری و شناسایی شد. با توجه به اینکه درختان افرا به غیر از جنگل‌ها، در فضاهای سبز و پارک‌ها نیز کشت می‌شوند به نظر می‌رسد که با برنامه‌ریزی صحیح و حمایت از دشمنان طبیعی می‌توان جلوی بالا رفتن جمعیت آفت را گرفت و آن را در حد قابل تحمل نگه داشت.

## References

- Khanjani, M. and Mirab-balou, M. 2007. Study on biology of walnut leaf gall mite (*Eriophyes tristriatus* Nalepa) in western Iran. *Journal of Biological Society of Iran* 19(4): 464–474.
- Lewis, T. 1973. Thrips: Their Biology, Ecology and Economic Importance. New York: Academic Press XVI, 340pp.
- Lewis, T. 1997. Pest thrips in perspective. In Lewis T. (Ed.). Thrips as crop pests. CAB International, Wallingford, UK. pp. 1–13.
- Loomans, A. 2003. Parasitoids as biological control agents of thrips pests. PhD. thesis, Wageningen University pp. 200.

بار از استان ایلام جمع‌آوری و گزارش می‌شود. به غیر از پارازیتیوید فوق، ۱۲ گونه‌ی شکارگر از حشرات و کنه‌ها نیز جمع‌آوری و شناسایی شد که در زیر به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

**۱. تریپس‌های شکارگو:** در این بررسی چهار گونه از تریپس‌های شکارگر با اسمی علمی Aeolothrips با اسامی علمی Aeolothripidae (*intermedius* Bagnall (خانواده‌ی *Scolothrips longicornis* Priesner و *Haplothrips flavitibia* Williams)، Thripidae (*Haplothrips globiceps* Bagnall (خانواده‌ی *Phlaeothripidae* (خانواده‌ی *Haplothrips* در حال تغذیه از تریپس افرا جمع‌آوری و شناسایی شدند؛ که در بین آن‌ها، تریپس شکارگر *A. intermedius* دارای جمعیت به نسبت بالایی در طول سال بوده ولی گونه‌ی *S. longicornis* فقط در ماه‌های مرداد و شهریور جمع‌آوری شد. گونه‌های جنس *Haplothrips* هر چند بیشتر گیاه‌خوارند (Priesner, 1964) ولی در این مطالعه، دو گونه‌ی شکارگر از آن‌ها به صورت موردنی جمع‌آوری شد.

**۲. سن‌های شکارگو:** سن‌ها دارای اهمیت قابل ملاحظه‌ای در کنترل بیولوژیک آفات هستند (Zanuncio et al., 1994). در این مطالعه، پنج گونه با اسمی علمی *Orius laevigatus* *Anthocoris pilosus* (Jakovlev) (خانواده‌ی *Orius niger* (Wolff) (Fieber) *Deraeocoris pallens* (Reuter)، Anthocoridae (*Nabis ferus* (L.) و (*Miridae* (خانواده‌ی *Nabidae* در بین آن‌ها سن‌های جنس *Orius laevigatus* به ویژه به دریابودند. در این آفت را در روز درختان افرا بودند.

- Mirab-balou, M.** 2013. A checklist of Iranian thrips (Insecta: Thysanoptera). **Far Eastern Entomologist** 267: 1–27.
- Mirab-balou, M., Mound, L. A. and Tong, X. L.** 2015. New combinations and a new generic synonym in the genus *Taeniothrips* (Thysanoptera: Thripidae). **Zootaxa** 3964(3): 371–378.
- Mirab-balou, M., Tong, X. L., Feng, J. N. and Chen, X. X.** 2011. Thrips (Insecta: Thysanoptera) of China. **Check List (Journal of Species Lists and Distribution)** 7(6): 720–744.
- Mirab-balou, M., Yang, S. L. and Tong, X. L.** 2014. Records of nine thrips (Insecta: Thysanoptera) from Qatar. **Arab Journal of Plant Protection** 32(3): 278–282.
- Mirzaei, J. and Mirab-balou, M.** 2015. Forest protection (with introduction of forest pests). Marze Danesh Press, Tehran-Iran, 243 pp. (In Persian).
- Obrycki, J. J. and Kring, T. J.** 1998. Predaceous Coccinellidae in biological control. **Annual Review of Entomology** 43: 295–321.
- Priesner, H.** 1949. Genera Thysanopterorum. Keys for the identification of the genera of the order Thysanoptera. **Bulletin de la Societe Royale entomologique d'Egypte** 33: 31–157.
- Pourhashemi, M., Mohajer, M. R., Zobeiri, M., Zahedi, G. and Panahi, P.** 2004. Identification of forest vegetation units in support of government management objectives in Zagros forests, Iran. **The Scandinavian Journal of Forest Research** 19(4): 72–77.
- Tan, J. L., Mirab-balou, M., He, J. H. and Chen, X. X.** 2010. The thrips-attacking genus *Ceranisus* (Hymenoptera: Eulophidae: Entedoninae) from Iran. **Entomotaxonomia** 32(1): 62–68.
- Teulon, D. A. J., Groninger, J. W. and Cameron, E. A.** 1994. Distribution and host plant associations of *Taeniothrips inconsequens* (Thysanoptera: Thripidae). **Environmental Entomology** 23: 587–611.
- Zanuncio, J. C., Alves, J. B., Zanuncio, T. V. and Garcia, J. F.** 1994. Hemipterus predators of eucalypt defoliator caterpillars. **Forest Ecology and Management** 65: 65–73.

Short paper

## Identification of natural enemies of maple thrips, *Taeniothrips inconsequens* (Uzel) (Thy.: Thripidae) in Ilam Province

**M. Mirab-balou\***

Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ilam University, 69315–516, Ilam, Iran

(Received: June 2, 2016- Accepted: November 14, 2016)

**Abstract**

The pear thrips, *Taeniothrips inconsequens* (Uzel) (Thysanoptera: Thripidae) is one of the most important pests, that is recently causes damages to Montpellier maple trees in Zagros forests, Ilam province (western Iran). In this study, the natural enemies of maple thrips were collected and identified by monthly sampling of thrips from Gachan and Manesht Mountains, in year 2015. Results indicated that natural enemies included one larval parasitoid, *Ceranisus menes* (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae), and 12 insects and mite predator species belonging to the nine following families: Aeolothripidae [*Aeolothrips intermedius* Bagnall], Thripidae [*Scolothrips longicornis* Priesner], Phlaeothripidae [*Haplothrips flavitibia* Williams, *Haplothrips globiceps* Bagnall], Anthocoridae [*Anthocoris pilosus* (Jakovlev), *Orius laevigatus* (Fieber), *Orius niger* (Wolff, 1811)], Miridae [*Deraeocoris pallens* (Reuter)], Nabidae [*Nabis ferus* (L.)], Coccinellidae [*Coccinella septempunctata* (L.)], Chrysopidae [*Chrysoperla carnea* (Stephens)], and Anystidae [*Anystis baccarum* (L.)]. All predators collected in this study were on maple trees along with maple thrips, among them *A. intermedius* and *Orius* spp. had higher population densities in contrast to other natural enemies.

**Key words:** maple thrips, natural enemies, parasitoid wasp, Zagros, Ilam.

---

\*Corresponding author: [majid.mirab@gmail.com](mailto:majid.mirab@gmail.com) ; [m.mirabbalou@ilam.ac.ir](mailto:m.mirabbalou@ilam.ac.ir)